

Navodilo za uporabo

VENITAN Forte 10 mg/100 i.e. v 1 g gela

escin/natrijev heparinat

Za otekle in boleče noge

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte farmacevtom.
- Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 14-ih dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Venitan Forte in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Venitan Forte
3. Kako uporabljati zdravilo Venitan Forte
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Venitan Forte
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Venitan Forte in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Venitan Forte vsebuje dve učinkovini:

- **escin**, ki je mešanica snovi, pridobljena iz semen navadnega divjega kostanja, ki deluje tako, da krepi napetost (tonus) ven ter zmanjšuje krhkost in prepustnost kapilar. Tako zmanjša otekanje, pospeši krvni obtok in izboljša presnovo v prizadetem tkivu.
- **heparin**, ki je normalna sestavina človeškega organizma. Deluje tako, da preprečuje strjevanje krvi, in s tem nastanek krvnih strdkov, ter deluje protivnetno.

Pomožni snovi dekspantenol in alantoin v zdravilu Venitan Forte pospešujeta prehajanje obeh učinkovin skozi kožo in zaradi svojih dodatnih lastnosti izboljšata njuno delovanje.

Zdravilo Venitan Forte priporočamo:

- **za lajšanje bolezní ven**, kot so:
 - boleče in vnete krčne žile (kažejo se kot oteklina ter občutek težkih in utrujenih nog (npr. zaradi dolgotrajnega stanja)),
 - krvni strdki v površinskih venah (tromboza),
 - vnetja ven s krvnimi strdki (tromboflebitisi), vnetja ven po injekcijah in infuzijah (flebitisi),
 - stanje po trombozi ali trombotičnem vnetju vene, ki povzroča zastoj odtekanja krvi z določenega področja in posledično otekanje, spremembe na koži, srbenje in bolečine (posttrombotični sindrom), krči v mečih, vnetja okolica golenske razjede;
- **za lokalno zdravljenje topih poškodb**, kot so podplutbe, udarnine, zmečkanine;
- **za preprečevanje nastanka in zdravljenje pooperativnih in drugih motečih brazgotin.**

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Venitan Forte

Ne uporabljajte zdravila Venitan Forte

- če ste alergični na učinkovine ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).;
- če imate poškodovano kožo, npr. pri opeklinah, ekcemu ali odprtih ranah.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravil Venitan Forte se posvetujte s farmacevtom.

Če imate vnetje kože, vnetje vene zaradi strdka ali podkožne zatrdline, močne bolečine, razjede, nenadno otekanje ene ali obeh nog, srčno ali ledvično popuščanje se morate nujno posvetovati z zdravnikom, ker imate lahko resno bolezen.

Uporaba gela Venitan Forte ne nadomesti dodatnih drugih zdravljenj in ukrepov, kot so uporaba hladnih obkladkov in nošenje predpisanih medicinskih kompresijskih nogavic.

Zdravilo Venitan Forte ne sme priti v stik z očmi in sluznicami. Po uporabi gela Venitan Forte si temeljito umite roke.

Otroci

Na voljo ni zadostnih študij o uporabi tega zdravila pri otrocih. Zdravila Venitan Forte zato ne smete uporabljati pri otrocih, mlajših od 12 let.

Druga zdravila in zdravilo Venitan Forte

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Medsebojno delovanje zdravila Venitan Forte z drugimi zdravili ni znano. Hkrati z zdravilom Venitan Forte ni priporočljivo na isti predel kože nanašati drugih zdravil za lokalno uporabo.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ker ni zadostnih študij o uporabi tega zdravila med nosečnostjo in dojenjem, uporaba zdravila Venitan Forte med nosečnostjo in dojenjem ni dovoljena.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Venitan Forte nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Venitan Forte vsebuje natrijev metilparahidroksibenzoat (E219)

Zdravilo Venitan Forte vsebuje natrijev metilparahidroksibenzoat (E219), ki lahko povzroči alergijske reakcije (tudi zapoznele).

Zdravilo Venitan Forte vsebuje propilenglikol (E1520)

Zdravilo Venitan Forte vsebuje propilenglikol (E1520), ki lahko povzroči draženje kože.

3. Kako uporabljati zdravilo Venitan Forte

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte s farmacevtom.

Tanko plast zdravila Venitan Forte **1- do 3-krat na dan** nanesite na kožo obolelih predelov in okolico, ga narahlo vtrite in masirajte od spodaj navzgor. Gel nanašajte postopno, v manjših količinah.

Če imate **vnetje ven**, gela ne vtirajte, temveč le nanesite na kožo.

Če imate razjedo goleni, **pazite, da gela ne nanesete na razjedo**, temveč le na kožo v okolici razjede, kjer je motena prekrvitev.

Pri krčnih žilah priporočamo kot dodatno zdravljenje povijanje nog z elastičnim povojem ali uporabo kompresijskih nogavic.

Uporaba pri otrocih

Zdravila Venitan Forte ne smete uporabljati pri otrocih, mlajših od 12 let.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Redki neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):
preobčutljivostne reakcije z znaki kot so rdečina, srbenje, izpuščaji in pekoč občutek na koži.
V tem primeru gel takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Venitan Forte

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »EXP:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Venitan Forte

- Učinkovini sta escin in natrijev heparinat.
1 g gela vsebuje 10 mg escina in 100 i. e. natrijevega heparinata.
- Pomožne snovi so: dekspantenol, alantoin, natrijev metilparahidroksibenzoat (E219), natrijev hidroksid (E524), karbomer, simetikon (E900), propilenglikol (E1520), prečiščena voda.

Izgled zdravila Venitan Forte in vsebina pakiranja

Zdravilo Venitan forte je brezbarven, rahlo opalescenten, prozoren gel.

V škatli je tuba s 50 g ali 100 g gela.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način izdaje zdravila Venitan Forte

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

Proizvajalec

Salutas Pharma GmbH, Lange Göhren 3, 39171 Osterweddingen, Nemčija

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemčija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 27. 5. 2022.