

## **NAVODILO ZA UPORABO**

## Navodilo za uporabo

### **Aksitinib Teva 1 mg filmsko obložene tablete** **Aksitinib Teva 5 mg filmsko obložene tablete**

aksitinib

**Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

#### **Kaj vsebuje navodilo**

1. Kaj je zdravilo Aksitinib Teva in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Aksitinib Teva
3. Kako jemati zdravilo Aksitinib Teva
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Aksitinib Teva
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

#### **1. Kaj je zdravilo Aksitinib Teva in za kaj ga uporabljamo**

Aksitinib Teva je zdravilo, ki vsebuje učinkovino aksitinib. Aksitinib zmanjšuje oskrbo tumorja s krvjo in upočasnjuje razraščanje raka.

Zdravilo Aksitinib Teva se uporablja za zdravljenje napredovalega raka ledvic (napredovalega karcinoma ledvičnih celic) pri odraslih, potem ko z drugim zdravilom (imenovanim sunitinib ali citokin) ni več mogoče zaustaviti napredovanja bolezni.

Če imate kakršnakoli vprašanja o tem, kako to zdravilo deluje ali zakaj vam je bilo predpisano, se posvetujte z zdravnikom.

#### **2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Aksitinib Teva**

##### **Ne jemljite zdravila Aksitinib Teva**

Če ste alergični na aksitinib ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6). Če menite, da bi lahko bili alergični na to zdravilo, se posvetujte z zdravnikom.

##### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

Pred začetkom jemanja zdravila Aksitinib Teva se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

- **Če imate visok krvni tlak.**  
Zdravilo Aksitinib Teva lahko zviša vaš krvni tlak. Pomembno je, da se pred začetkom jemanja tega zdravila in v rednih časovnih presledkih med jemanjem pri vas preverja krvni tlak. Če imate visok krvni tlak (hipertenzijo), morda dobivate zdravila za zniževanje krvnega tlaka. Zdravnik se mora pred začetkom zdravljenja z zdravilom Aksitinib Teva in med zdravljenjem prepričati, da je vaš krvni tlak pod nadzorom.

- **Če imate motnje delovanja žleze ščitnice.**  
Zdravilo Aksitinib Teva lahko povzroči motnje delovanja žleze ščitnice. Obvestite zdravnika, če se hitreje utrudite, vas običajno bolj zebe kot druge ljudi, ali če se vaš glas med jemanjem tega zdravila poglobi. Delovanje vaše žleze ščitnice je treba preveriti pred začetkom jemanja zdravila Aksitinib Teva in v rednih časovnih presledkih med jemanjem. Če vaša žleza ščitnica pred začetkom zdravljenja ali med zdravljenjem ne tvori dovolj ščitničnega hormona, morate jemati zdravila za nadomeščanje ščitničnega hormona.
- **Če ste pred kratkim imeli težave s krvnimi strdki v venah ali arterijah (vrsti krvnih žil), vključno s kapjo, srčnim infarkt, embolijo ali trombozo.**  
Tako se obrnite na nujno zdravniško pomoč in pokličite zdravnika, če se vam med zdravljenjem s tem zdravilom pojavijo simptomi, kot so bolečine ali pritisk v prsnem košu; bolečine v rokah, hrbtu, vratu ali čeljusti; kratka sapa; otrplost ali oslabelost na eni strani vašega telesa; težave z govorom; glavobol; spremembe vida ali omotica.
- **Če imate težave s krvavitvami.**  
Zdravilo Aksitinib Teva lahko zveča možnosti, da pri vas pride do krvavitev. Obvestite zdravnika, če med zdravljenjem s tem zdravilom pride do kakršnekoli krvavitve, izkašljevanja krvi ali krvavega izpljunka.
- **Če imate ali ste imeli anevrizmo (razširitev in oslabeitev stene krvne žile) ali raztrganino v steni krvne žile.**
- **Če se vam med zdravljenjem s tem zdravilom pojavijo hude bolečine v želodcu (trebuhu) ali bolečine v želodcu, ki ne minejo.**  
Zdravilo Aksitinib Teva lahko zveča tveganje za predrtje želodca ali črevesa ali za nastanek fistule (nenormalen, cevi podoben prehod iz ene normalne telesne votline do druge telesne votline ali kože).  
Obvestite zdravnika, če imate med zdravljenjem s tem zdravilom hude bolečine v trebuhu.
- **Če je pri vas načrtovan kirurški poseg ali če imate nezaceljeno rano.**  
Zdravnik mora zdravljenje z zdravilom Aksitinib Teva prekiniti vsaj 24 ur pred kirurškim posegom, ker lahko vpliva na celjenje rane. Potem ko se rana zadovoljivo zaceli, je treba ponovno začeti zdravljenje s tem zdravilom.
- **Če se vam med zdravljenjem s tem zdravilom pojavijo simptomi, kot so glavobol, zmedenost, epileptični napadi (krči) ali spremembe vida z zvišanim krvnim tlakom ali brez njega.**  
Tako se obrnite na nujno zdravniško pomoč in pokličite zdravnika. V tem primeru lahko gre za redke nevrološki neželeni učinek, imenovan sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije.
- **Če imate težave z jetri.**  
Zdravnik mora pred začetkom zdravljenja z zdravilom Aksitinib Teva in med njim opraviti preiskave krvi, da preveri delovanje vaših jeter.
- **Če se vam med zdravljenjem s tem zdravilom pojavijo simptomi, kot so čezmerna utrujenost, otekanje trebuha, nog ali gležnjev, kratka sapa ali izstopajoče žile na vratu.**  
Zdravilo Aksitinib Teva lahko zveča tveganje za razvoj srčnega popuščanja. Med zdravljenjem z aksitinibom bo zdravnik redno spremljal znake ali simptome srčnega popuščanja.

### Otroci in mladostniki

Uporaba zdravila Aksitinib Teva pri ljudeh, mlajših od 18 let, ni priporočljiva. Pri otrocih in mladostnikih uporabe tega zdravila niso preučevali.

## Druga zdravila in zdravilo Aksitinib Teva

Nekatera zdravila lahko vplivajo na delovanje zdravila Aksitinib Teva ali pa zdravilo Aksitinib Teva vpliva na njihovo delovanje. Obvestite zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro, če ste pred kratkim jemali, trenutno jemljete ali pa boste morda začeli jemati katerokoli drugo zdravilo, tudi če gre za zdravila brez recepta, vitamine in zdravila rastlinskega izvora. Zdravila, navedena v tem navodilu, morda niso edina, ki bi lahko medsebojno delovala z zdravilom Aksitinib Teva.

Naslednja zdravila lahko zvečajo tveganje za pojav neželenih učinkov zdravila Aksitinib Teva:

- ketokonazol ali itraconazol, ki se uporabljata za zdravljenje glivičnih okužb;
- klaritromicin, eritromicin ali telitromicin, antibiotiki, ki se uporabljajo za zdravljenje bakterijskih okužb;
- atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir ali sakvinavir, ki se uporabljajo za zdravljenje okužb s HIV/AIDS-a;
- nefazodon, ki se uporablja za zdravljenje depresije.

Naslednja zdravila lahko zmanjšajo učinkovitost zdravila Aksitinib Teva:

- rifampicin, rifabutin ali rifapentin, ki se uporabljajo za zdravljenje tuberkuloze;
- deksametazon, steroidno zdravilo, ki se predpisuje za mnoga različna stanja, vključno s hudimi boleznimi;
- fenitoin, karbamazepin ali fenobarbital, antiepileptiki, ki se uporabljajo za zaustavitev epileptičnih napadov ali krčev;
- šentjanževka (*Hypericum perforatum*), zdravilo rastlinskega izvora, ki se uporablja za zdravljenje depresije.

Med zdravljenjem z zdravilom Aksitinib Teva **ne smete** jemati teh zdravil. Če jemljete katerokoli izmed njih, to povejte zdravniku, farmacevtu ali medicinski sestri. Zdravnik bo morda spremenil odmerek teh zdravil, spremenil odmerek zdravila Aksitinib Teva ali vam predpisal kakšno drugo zdravilo.

Zdravilo Aksitinib Teva lahko okrepi neželene učinke, povezane s teofilinom, ki se uporablja za zdravljenje astme ali drugih pljučnih bolezni.

## Zdravilo Aksitinib Teva skupaj z hrano in pijačo

Tega zdravila ne jemljite skupaj z grenivkami ali grenivkinim sokom, ker to lahko zveča možnost za pojav neželenih učinkov.

## Nosečnost in dojenje

- Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.
- Zdravilo Aksitinib Teva lahko škoduje nerojenemu otroku ali dojenemu otroku.
- Tega zdravila ne jemljite med nosečnostjo. Če ste noseči ali če bi lahko zanosili, se pred začetkom jemanja posvetujte z zdravnikom.
- Med jemanjem zdravila Aksitinib Teva in še en teden po zadnjem odmerku tega zdravila uporabljajte zanesljivo metodo kontracepcije, da preprečite nosečnost.
- Med zdravljenjem z zdravilom Aksitinib Teva ne smete dojiti. Če dojite, se mora zdravnik z vami pogovoriti glede prenehanja dojenja oziroma prenehanja zdravljenja z zdravilom Aksitinib Teva.

## Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Če vas obide omotica in/ali ste med jemanjem zdravila Aksitinib Teva utrujeni, bodite pri vožnji ali upravljanju strojev še posebno previdni.

### **Zdravilo Aksitinib Teva vsebuje laktozo**

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

### **Zdravilo Aksitinib Teva vsebuje natrij**

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na filmsko obloženo tableto, kar v bistvu pomeni 'brez natrija'.

## **3. Kako jemati zdravilo Aksitinib Teva**

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

Priporočeni odmerek je 5 mg dvakrat na dan. Zdravnik vam lahko odmerek zdravila pozneje zveča ali zmanjša, odvisno od tega, kako prenašate zdravljenje z zdravilom Aksitinib Teva.

Tablete pogoltnite cele, z nekaj vode, skupaj s hrano ali brez nje. Odmerke zdravila Aksitinib Teva jemljite v približno 12-urnih presledkih.

### **Uporaba pri otrocih in mladostnikih**

Uporaba zdravila Aksitinib Teva pri ljudeh, mlajših od 18 let, ni priporočljiva. Pri otrocih in mladostnikih uporabe tega zdravila niso preučevali.

### **Če ste vzeli večji odmerek zdravila Aksitinib Teva, kot bi smeli**

Če ste pomotoma vzeli preveč tablet ali odmerek, ki je večji od potrebnega, se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Če je mogoče, zdravniku pokažite škatlo zdravila ali to navodilo za uporabo. Morda boste potrebovali zdravniško oskrbo.

### **Če ste pozabili vzeti zdravilo Aksitinib Teva**

Vzemite naslednji odmerek zdravila ob predvidenem času. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

### **Če bruhate med zdravljenjem z zdravilom Aksitinib Teva**

Če bruhate, ne smete vzeti dodatnega odmerka. Naslednji predpisani odmerek vzemite ob običajnem času.

### **Če ste prenehali jemati zdravilo Aksitinib Teva**

Če tega zdravila ne morete jemati tako, kot vam je predpisal zdravnik, ali imate občutek, da ga ne potrebujete več, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

## **4. Možni neželeni učinki**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

**Nekateri neželeni učinki so lahko resni. Nemudoma se posvetujte z zdravnikom, če se pri vas pojavi katerikoli izmed naslednjih resnih neželenih učinkov (glejte tudi poglavje 2, "Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Aksitinib Teva"):**

- **Srčno popuščanje.** Obvestite zdravnika, če se pojavijo čezmerna utrujenost, otekanje trebuha, nog ali gležnjev, kratka sapa ali izstopajoče žile na vratu.
- **Krvni strdki v venah ali arterijah (vrsti krvnih žil), vključno z možgansko kapjo, srčnim infarkt, embolijo ali trombozo.** Takoj se obrnite na nujno zdravniško pomoč in pokličite zdravnika, če se vam med zdravljenjem s tem zdravilom pojavijo simptomi, kot so bolečine ali pritisk v prsnem košu; bolečine v rokah, hrbtu, vratu ali čeljusti; kratka sapa; otrplost ali oslabeledost na eni strani vašega telesa; težave z govorom; glavobol; spremembe vida ali omotica.
- **Krvavitev.** Nemudoma obvestite zdravnika, če se vam med zdravljenjem z zdravilom Aksitinib Teva pojavi katerikoli od naslednjih simptomov ali če imate hude težave, povezane s krvavitvami: črno, lepljivo blato, izkašljevanje krvi ali krvav izpljunek ali spremembe v duševnem stanju.
- **Predrtje želodca ali črevesa ali nastanek fistule (nenormalen, cevi podoben prehod iz ene normalne telesne votline do druge telesne votline ali kože).** Obvestite zdravnika, če imate hude bolečine v trebuhu.
- **Izrazito zvišanje krvnega tlaka (hipertenzivna kriza).** Obvestite zdravnika, če imate zelo visok krvni tlak, hud glavobol ali hude bolečine v prsnem košu.
- **Otekanje možganov, ki lahko izzveni (sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije).** Če se vam pojavijo simptomi, kot so glavobol, zmedenost, epileptični napadi (krči) ali spremembe vida z zvišanim krvnim tlakom ali brez njega, se takoj obrnite na nujno zdravniško pomoč in pokličite zdravnika.

Drugi neželeni učinki zdravila Aksitinib Teva so lahko:

**Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov**

- visok krvni tlak ali zvišanje krvnega tlaka
- driska, občutek slabosti (slabost s siljenjem na bruhanje ali bruhanje), bolečine v želodcu, slaba prebava, bolečine v ustih, jeziku ali grlu, zaprtje
- kratka sapa, kašelj, hripavost
- pomanjkanje energije, občutek šibkosti ali utrujenosti
- premalo dejavna žleza ščitnica (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi)
- rdečina in otekanje dlani ali podplato (sindrom dlani-podplato), kožni izpuščaji, suha koža
- bolečine v sklepih, bolečine v dlaneh ali stopalih
- izguba apetita
- beljakovine v urinu (to se lahko pokaže pri preiskavah urina)
- zmanjšanje telesne mase
- glavobol, motnje v zaznavanju okusa ali nezmožnost zaznavanja okusa

**Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov**

- dehidracija (izguba telesnih tekočin)
- odpoved ledvic
- napenjanje (vetrovi), hemoroidi, krvavitve iz dlesni, krvavitve iz danke, pekoč ali zbadajoč občutek v ustih
- preveč dejavna žleza ščitnica (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi)
- vnetje žrela ali nosne sluznice in draženje žrela
- bolečine v mišicah
- krvavitve iz nosu

- srbeča koža, pordelost kože, izpadanje las in dlak
- zvenenje v ušesih (tinitus)
- zmanjšanje števila rdečih krvnih celic (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi)
- zmanjšanje števila krvnih ploščic (celice, ki sodelujejo pri strjevanju krvi) (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi)
- prisotnost rdečih krvnih celic v urinu (to se lahko pokaže pri preiskavah urina)
- spremembe vrednosti različnih snovi/encimov v krvi (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi)
- zvečanje števila rdečih krvnih celic (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi)
- otekanje trebuha, nog ali gležnjev, izstopajoče žile na vratu, čezmerna utrujenost, kratka sapa (znaki srčnega popuščanja)
- fistula (nenormalen, cevi podoben prehod iz ene normalne telesne votline do druge telesne votline ali kože)
- omotica
- vnetje žolčnika

**Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov**

- zmanjšanje števila belih krvnih celic (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi)

**Neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti**

- razširitev in oslabitev stene krvne žile ali raztrganina v steni krvne žile (anevrizme in disekcije arterij)

**Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: [h-farmakovigilanca@jazmp.si](mailto:h-farmakovigilanca@jazmp.si)

spletna stran: [www.jazmp.si](http://www.jazmp.si)

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

## 5. Shranjevanje zdravila Aksitinib Teva

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden škatli in pretisnem omotu poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravilo shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago. To zdravilo ne zahteva posebnih temperaturnih pogojev za shranjevanje.

Ne uporabljajte tega zdravila, ki je poškodovano ali kaže znake, da je že bilo odprto.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

## 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

### Kaj vsebuje zdravilo Aksitinib Teva

- Učinkovina je aksitinib.  
Aksitinib Teva 1 mg filmsko obložene tablete: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 1 mg aksitiniba.  
Aksitinib Teva 5 mg filmsko obložene tablete: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 5 mg aksitiniba.
- Druge sestavine zdravila so mikrokristalna celuloza, laktoza monohidrat (glejte poglavje 2, "Zdravilo Aksitinib Teva vsebuje laktozo"), premreženi natrijev karmelozat (glejte poglavje 2, "Zdravilo Aksitinib Teva vsebuje natrij"), magnezijev stearat, hipromeloza, titanov dioksid (E171), triacetin (E1518), rdeči železov oksid (E172).

### Izgled zdravila Aksitinib Teva in vsebina pakiranja

Aksitinib Teva 1 mg filmsko obložene tablete, so rdeče, okrogle bikonveksne obložene tablete, premera približno 6 mm z vtisnjeno oznako "A7TI" na eni strani in "1" na drugi strani.

Aksitinib Teva 5 mg filmsko obložene tablete, so rdeče, ovalne bikonveksne obložene tablete, dolge približno 15 mm, široke 8 mm z vtisnjeno oznako "A7TI" na eni strani in "5" na drugi strani.

OPA/Al/PVC/Al (Al/Al) pretisni omoti in perforirani deljivi pretisni omoti s posameznimi odmerki v škatli. Pakiranja vsebujejo 56, 60, 56 x 1 ali 120 x 1 filmsko obloženih tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

### Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Aksitinib Teva

H/Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

### Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

#### Imetnik dovoljenja za promet

Teva GmbH  
Graf-Arco-Strasse 3  
89079 Ulm  
Nemčija

#### Proizvajalci

Synthon Hispania S.L.  
c/ Castelló 1  
08830 Sant Boi de Llobregat  
Barcelona  
Španija

Synthon B.V.  
Microweg 22  
6545 CM Nijmegen  
Nizozemska

Balkanpharma-Dupnitsa AD  
Samokovsko Shosse Str. 3



2600 Dupnitsa  
Bolgarija

**Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:**

Avstrija:	Axitinib-ratiopharm 1 mg Filmtabletten Axitinib-ratiopharm 3 mg Filmtabletten Axitinib-ratiopharm 5 mg Filmtabletten Axitinib-ratiopharm 7 mg Filmtabletten
Belgija:	Axitinib Teva 1 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten Axitinib Teva 3 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten Axitinib Teva 5 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten Axitinib Teva 7 mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten
Bolgarija:	АКСИТИНИБ Тева 1 mg филмирани таблетки Axitinib Teva 1 mg film-coated tablets АКСИТИНИБ Тева 5 mg филмирани таблетки Axitinib Teva 5 mg film-coated tablets
Danska:	Axitinib Teva
Francija:	Axitinib Teva 1 mg, Comprimé Pelliculé Axitinib Teva 3 mg, Comprimé Pelliculé Axitinib Teva 5 mg, Comprimé Pelliculé Axitinib Teva 7 mg, Comprimé Pelliculé
Grčija:	Axitinib/Teva
Hrvaška:	Aksitinib Teva 1 mg filmom obložene tablete Aksitinib Teva 5 mg filmom obložene tablete
Italija:	Axitinib Teva
Luksemburg:	Axitinib Teva 1 mg comprimés pelliculés Axitinib Teva 3 mg comprimés Pelliculés Axitinib Teva 5 mg comprimés pelliculés Axitinib Teva 7 mg comprimés Pelliculés
Nizozemska:	Axitinib Teva 1 mg, filmomhulde tabletten Axitinib Teva 3 mg, filmomhulde tabletten Axitinib Teva 5 mg, filmomhulde tabletten Axitinib Teva 7 mg, filmomhulde tabletten
Nemčija:	Axitinib-ratiopharm 1 mg Filmtabletten Axitinib-ratiopharm 3 mg Filmtabletten Axitinib-ratiopharm 5 mg Filmtabletten Axitinib-ratiopharm 7 mg Filmtabletten
Norveška:	Axitinib Teva
Portugalska:	Axitinib Teva
Španija:	Axitinib Teva 1 mg comprimidos recubiertos con película EFG Axitinib Teva 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Švedska:	Axitinib Teva
Slovenija:	Aksitinib Teva 1 mg filmsko obložene tablete Aksitinib Teva 5 mg filmsko obložene tablete

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 13. 5. 2024.**

<Drugi viri informacij>

<Zadnje odobrene informacije o tem zdravilu so na voljo s skeniranjem kode QR <v navodilu za uporabo> <na škatli zdravila> s pametnim telefonom/mobilno napravo. Enake informacije so na voljo tudi na povezavi [dodati URL]> <in spletni strani Centralne baze zdravil, [www.cbz.si](http://www.cbz.si)>.