

Navodilo za uporabo

Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 10 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/25 mg filmsko obložene tablete

kinapril/hidroklorotiazid

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis
3. Kako uporabljati zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis vsebuje dve zdravilni učinkovini: kinapril in hidroklorotiazid. Kinapril v telesu zmanjša nastajanje snovi, ki zvišujejo krvni tlak. Te snovi povzročajo skrčenje žil, pa tudi zadrževanje soli in vode v telesu. Kinapril spada v skupino zdravil, imenovanih zaviralci angiotenzinske konvertaze (zaviralci ACE).

Hidroklorotiazid deluje diuretično (odvaja vodo) in znižuje krvni tlak. Spada v skupino zdravil, imenovanih tiazidi (sulfonamidi).

Zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis uporabljamo za zdravljenje visokega krvnega tlaka, kadar je primerno kombinirano zdravljenje z zaviralcem ACE (kinapril) in diuretikom (hidroklorotiazid).

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis

Ne jemljite zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis

- če ste alergični na kinapril, druge zaviralce ACE, hidroklorotiazid, druga zdravila, ki vsebujejo sulfonamide, ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če so vam kdaj otekle noge, roke, obraz, sluznice ali jezik (angioedem), ko ste jemali kakšen zaviralec ACE, ali zaradi kakšnega drugega neznanega razloga, ali če ste imeli angioedem vi ali kdo od vaših svojcev (to stanje je lahko podedovano).
- če ste noseči več kot 3 mesece. (Zdravilu Kinapril/hidroklorotiazid Actavis se je tudi med zgodnjo nosečnostjo bolje izogniti – glejte poglavje o nosečnosti.)
- če imate zelo okvarjeno delovanje jeter.
- če imate hude težave z ledvicami ali težave z odvajanjem vode (anurija).
- če imate sladkorno bolezen ali okvarjeno delovanje ledvic in se zdravite z zdravilom za znižanje krvnega tlaka, ki vsebuje aliskiren.
- če imate oviran odtok krvi iz srca (dinamično obstrukcijo iztočnega dela levega prekata).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravniku morate povedati za vse zdravstvene težave, ki jih imate ali ste jih kdaj imeli, še zlasti:

- če se vam pojavljajo dolgotrajne driske ali bruhanje.
- če uporabljate dodatke kalija, zdravila, ki zadržujejo kalij, nadomestke soli, ki vsebujejo kalij, ali imate predpisano dieto z malo soli.
- če jemljete diuretična zdravila (zdravila za odvajanje vode). Zdravnik vam bo pred uvedbo zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis morda ukinil zdravljenje z diuretikom in korigiral pomanjkanje tekočine in/ali soli.
- če imate šibko srce (insuficienco srca), kakšno bolezen srca (npr. nekatere okvare zaklopki ali zadebelitev srčne mišice). Zdravnik vas bo morda moral kontrolirati in vam spremeniti odmere zdravila.
- če imate kakšno bolezen jeter, zmanjšano delovanje ledvic ali presajeno ledvico. Zdravnik vas bo morda moral kontrolirati in vam spremeniti odmere zdravila.
- če imate sladkorno bolezen. V prvih mesecih zdravljenja boste morali pogosteje kontrolirati krvni sladkor. Glejte tudi Druga zdravila in zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis.
- če ste na hemodializi. Zdravniku morate povedati, da jemljete to zdravilo, tako da bo izbral postopek, ki ne povzroča preobčutljivostnih reakcij.
- če se zdravite zaradi preobčutljivosti na pike čebel ali os (desenzibilizacijsko zdravljenje).
- če opravljate postopek za odstranitev slabega holesterola iz krvi (t. i. aferezo LDL), ne smete jemati zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis, da ne bi prišlo do preobčutljivostnih reakcij.
- če imate kakšno vnetno bolezen, ki jo povzroča imunski sistem (bolezen veziva), npr. revmatoidni artritis, skleroderma ali sistemski eritematozni lupus.
- če jemljete zdravila, ki vplivajo na imunski sistem, alopurinol (zdravilo proti protinu) ali prokainamid.
- če imate protin.
- če ste kdaj imeli alergijske reakcije na določeno zdravilo (npr. na sulfonamide ali penicilin). To lahko poveča verjetnost pojava neželenih učinkov, ki prizadenejo oči.
- če jemljete katero od naslednjih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka:
 - blokator receptorjev angiotenzina II (ARB) (ta zdravila imenujemo tudi "sartani" – mednje spadajo na primer valsartan, telmisartan in irbesartan), še zlasti če imate kakšne težave z ledvicami, ki so povezane s sladkorno boleznijo
 - aliskiren

Zdravnik vam bo morda v rednih presledkih kontroliral delovanje ledvic, krvni tlak in količino elektrolitov (npr. kalija) v krvi.

Glejte tudi informacije pod naslovom "Ne jemljite zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis".

Zdravniku morate povedati, če domnevate, da ste noseči (ali če bi lahko zanosili). Zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis ni priporočljivo uporabljati v zgodnji nosečnosti. Če ste noseči več kot 3 mesece, pa ga sploh ne smete uporabljati, ker lahko med tem obdobjem resno škoduje otroku (glejte poglavje o nosečnosti).

Pred kirurškim zdravljenjem in narkozo (to velja tudi za zobno zdravljenje) morate zdravniku oz. zobozdravniku povedati, da jemljete zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis: obstaja namreč možnost, da bi se vam krvni tlak med anestezijo zelo močno znižal.

Zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis lahko vpliva na izvide nekaterih laboratorijskih preiskav. Če morate pri svojem zdravniku ali v bolnišnici opraviti kakršne koli preiskave, morate zdravniku oziroma v bolnišnici povedati, da jemljete zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis.

Če se nenadoma pojavijo meglen vid, izguba vida ali močna bolečina v očesu, morate nemudoma poiskati zdravniško pomoč. To so simptomi nenavadne reakcije s posledičnimi motnjami vida in zvišanim očesnim tlakom, ki jih povzroči zdravilna učinkovina hidroklorotiazid. Če to stanje ni zdravljeno, lahko povzroči trajno izgubo vida.

Med uporabo zaviralcev ACE je opisan kašelj. Če se vam med zdravljenjem z zdravilom Kinapril/hidroklorotiazid Actavis pojavi kašelj, morate o tem obvestiti zdravnika.

Etnične razlike: Črnci so med jemanjem zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis lahko bolj nagnjeni k nastanku hude alergijske reakcije. Tako kot drugi zaviralci ACE je lahko tudi kinapril manj učinkovit pri črncih kot pri nečrncih.

Otroci in mladostniki

Zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis pri otrocih in mladostnikih ne smemo uporabljati.

Druga zdravila in zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Nekatera zdravila lahko vplivajo na zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis, po drugi strani pa lahko to zdravilo vpliva na nekatera druga zdravila.

Posebno pomembno je, da vaš zdravnik ve, če dobivate katero od naslednjih zdravil:

- tetraciklinske antibiotike, ker se učinek tetraciklinov lahko zmanjša.
- druga zdravila, ki znižujejo krvni tlak, npr. nitrate, ki se uporabljajo za zdravljenje koronarne bolezni, in druga zdravila za zniževanje krvnega tlaka. Krvni tlak lahko znižujejo tudi triciklični antidepresivi, zdravila za zdravljenje psihoz, zdravila, ki delujejo uspavalno (barbiturati), močni analgetiki (narkotiki) in zdravila, ki se uporabljajo skupaj z anestetiki.
- diuretike, ki ohranjajo kalij (npr. spironolakton, triamteren in amilorid), in dodatke kalija, ker se lahko količina kalija v telesu preveč poveča. Količino kalija v krvi lahko povečata tudi heparin (ki se uporablja za preprečevanje krvnih strdkov) in trimetoprim (antibiotik, ki se uporablja npr. pri okužbah sečil).
- diuretike (zdravila za odvajanje vode), ker se učinek zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis na znižanje krvnega tlaka lahko poveča.
- litij (uporablja se za zdravljenje manično-depresivne bolezni).
- nesteroidna protivnetna zdravila proti bolečinam (NSAIDs)), npr. acetilsalicilno kislino (Aspirin), ibuprofen ali ketoprofen.
- določena zdravila proti astmi in adrenalin lahko zmanjšajo učinek zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis.
- zdravila proti sladkorni bolezni (tako insulin kot tablete). Zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis lahko zmanjša njihov učinek proti sladkorni bolezni.
- antacidi (zdravila proti zgagi) lahko zmanjšajo učinek zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis.
- alopurinol (uporablja se za zdravljenje protina), prokainamid (uporablja se za zdravljenje nerednega bitja srca), zdravila za zdravljenje raka ali zdravila, ki zavirajo telesni imunski sistem (imunosupresivi).
- amfotericin B (zdravilo za zdravljenje glivičnih okužb), karbenoksolon (zdravilo proti vnetju žrela), kortikosteroide (zdravila za zdravljenje vnetja), kortikotropin (hormon ACTH), zdravila za srce (digitalis) ali določena odvajala, ker se vam količina kalija v krvi lahko zmanjša.
- kalcijeve soli, ker se vam količina kalcija v krvi lahko poveča.
- določena zdravila proti povišanim koncentracijam maščob v krvi (kot soolestiramin inolestipol), ker se učinek zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis lahko zmanjša, če so uporabljena hkrati.
- mišični relaksant (tubokurarinijev klorid), ker se njegov učinek lahko poveča.
- zdravila, ki lahko povzročijo *torsades de pointes* (posebno vrsto motnje srčnega ritma).

Zdravnik vam bo morda moral spremeniti odmere in/ali upoštevati druge previdnostne ukrepe:

- Če jemljete blokator receptorjev angiotenzina II (ARB) ali aliskiren (glejte tudi informacije pod naslovoma "Ne jemljite zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis" in "Opozorila in previdnostni ukrepi").

Zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis skupaj s hrano in alkoholom

Zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis je mogoče jemati neodvisno od obrokov.

Če med zdravljenjem z zdravilom Kinapril/hidroklorotiazid Actavis pijete alkoholne pijače, se vam lahko pojavijo omotica/omedlevica, utrujenost in šibkost, in sicer zato, ker vam zdravilo lahko močno zniža krvni tlak.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če domnevate, da ste noseči (ali če bi lahko zanosili). Zdravnik vam bo praviloma svetoval, da nehanje jemati zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis, preden zanosite ali čim ugotovite, da ste noseči, in vam bo namesto zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis predpisal neko drugo zdravilo. Zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis med nosečnostjo ni priporočljivo uporabljati. Če ste noseči več kot 3 mesece, pa ga sploh ne smete uporabljati, ker lahko med tem obdobjem resno škoduje otroku.

Dojenje

Zdravniku morate povedati, če dojite ali če boste v kratkem začeli dojit.

Zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis ni priporočljivo za doječe matere.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Med jemanjem zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis se vam lahko pojavi omotica in utrujenost. To lahko vpliva na vašo sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. Kako jemati zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek je 10 mg kinaprila in 12,5 mg hidroklorotiazida (ena tableta zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 10 mg/12,5 mg) zjutraj. Največji odmerek je 20 mg kinaprila in 25 mg hidroklorotiazida (ena tableta zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/25 mg).

Če ste starejši ali imate okvarjeno delovanje ledvic, vam bo morda zdravnik predpisal manjši odmerek.

Zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis ne smejo dobivati otroci.

Tablete je treba vzeti s 1/2 kozarca vode.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis, kot bi smeli

Za nasvet se nemudoma obrnite na zdravnika, ambulantno za nujno pomoč najbližje bolnišnice.

Preveliko odmerjanje lahko povzroči simptome, kot je padec krvnega tlaka z omotico in omedlevico.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjo tableto.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega od naštetih neželenih učinkov, prenehajte jemati zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis in se nemudoma posvetujte z zdravnikom:

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- bolečina v prsih, čeljusti ali hrbtu (angina pectoris)
- srčni infarkt. Med simptomi so lahko bolečina v prsih, tiščanje v prsih, kratka sapa ali težko dihanje

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- šibkost rok, nog ali težave z govorjenjem, kar so simptomi male možganske kapi (tranzitorna ishemična ataka)
- huda alergijska reakcija z otekanjem obraza, jezika in žrela, ki lahko povzroči hude težave z dihanjem (angioedem)

Zelo redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- otekllost v črevesu, ki se kaže s simptomi, kot so bolečina v želodcu, slabost v želodcu (siljenje na bruhanje) in bruhanje (angioedem tankega črevesa)
- zapora črevesa

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- anemija, ki povzroči težko dihanje ali bledico
- krvavitve ali večja nagnjenost k podplutbam kot po navadi; vzrok tega je zmanjšano število trombocitov (trombocitopenija)
- hud, obsežen kožni izpuščaj z mehurji (vključno s Stevens-Johnsonovim sindromom in toksično epidermalno nekrolizo) ali intenzivna pordečelost kože z luščenjem (eksfoliativni dermatitis)
- nenadna alergijska reakcija s kratko sapo, izpuščajem, piskajočim dihanjem in padcem krvnega tlaka (anafilaktoidna reakcija)
- zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis lahko povzroči zmanjšanje števila belih krvnih celic in odpornost proti okužbam se lahko zmanjša. Če se vam pojavi okužba s simptomi, kot so povišana telesna temperatura in resno poslabšanje splošnega stanja, ali povišana telesna temperatura z lokalnimi znaki okužbe, npr. vnetje grla/žrela/ust ali težave s sečili, morate nemudoma k zdravniku. S preiskavo krvi bo preveril, ali imate morda zmanjšano število belih krvnih celic (nevtropenija/agranulocitozo). Zdravniku morate povedati, da jemljete to zdravilo.

Opisani so bili tudi naslednji neželeni učinki:

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- težave s spanjem
- omotica
- vnetje dihal, kašelj
- okužbe nosu ali žrela
- zamašenost nosu in/ali izcedek iz nosu (rinitis)
- slabost v želodcu (siljenje na bruhanje), bruhanje, driska, težave z želodcem, bolečine v želodcu
- glavobol, utrujenost, zaspanost, šibkost
- mišične bolečine, bolečine v hrbtu, bolečine v prsih
- neredno ali močno bitje srca (palpitacije), hitro bitje srca (tahikardija)
- visoka koncentracija sečne kisline v krvi, ki povzroči otekllost sklepov in bolečine v njih (protin)
- zvišanje kalija v krvi
- spremembe v izvidih krvi, ki kažejo delovanje ledvic
- razširitev žile

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- težave z ledvicam in sečili, okužba sečil
- zastajanje tekočine, ki povzroča otekllost tkiv
- zmedenost, živčnost, potrtost
- omotica ali vrtoглаvica
- zvišan nivo sladkorja v krvi
- mravljinčenje
- motnja okušanja, leno oko, zvonjenje v ušesih (tinitus)

- nizek krvni tlak, omedlevica
- težko dihanje, vnetje obnosnih votlin (sinuzitis)
- suhost ust ali žrela
- izpuščaj na koži, večja občutljivost kože za svetlobo, srbenje, izpadanje las
- bolečine v sklepih
- zvišana telesna temperatura, močnejše znojenje
- virusna okužba
- okvarjeno spolno delovanje
- vetrovi (flatulenca)

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- težave z ravnotežjem
- zaprtost
- vnetje jezika
- vnetje pljuč, ki lahko povzroči težko dihanje, kašelj in zvišano telesno temperaturo
- vnetje žil (vaskulitis)
- zvišana telesna temperatura, bolečine v mišicah in sklepih skupaj s težavami s kožo
- luskavici (psoriazi) podobni izpuščaji

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- koprivnica
- zamegljen vid

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- težave z dihanjem ali piskanje (bronhospazem)
- vnetje trebušne slinavke, ki povzroči bolečine v trebuhu
- težave z jetri, ki lahko povzročijo zlatenico (porumenelost kože in oči)
- spremembe v izvidih krvi, ki kažejo delovanje jeter
- zvišan holesterol in trigliceridi v krvi
- visok nivo posebnega tipa belih krvničk (eozinofilcev)
- zvišan nivo protiteles
- povečana stopnja sedimentacije (SR) rdečih krvnih celic
- obarvanje kože
- padec krvnega tlaka, ko vstanete
- možganska kap (cerebrovaskularni insult)
- vnetje ledvic
- neredno bitje srca (motnje srčnega ritma)
- alergijsko stanje, ki povzroča bolečine v sklepih, kožne izpuščaje in vročino (sistemski eritematozni lupus)
- vnetje sluznice v jetrih, srcu ali v trebuhu (serositis)

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte zdravniku ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za zastrupitve, Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Faks: + 386 (0)1 434 76 46, e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Pretisni omoti: Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Plastenke: Vsebnik shranjujte tesno zaprt.

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na pakiranju za oznako EXP. Rok uporabnosti se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis

- Zdravilni učinkovini sta kinapriljev klorid in hidroklorotiazid.
Zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 10 mg/12,5 mg vsebuje kinapriljev klorid v količini, ki ustreza 10 mg kinaprila, in 12,5 mg hidroklorotiazida.
Zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/12,5 mg vsebuje kinapriljev klorid v količini, ki ustreza 20 mg kinaprila, in 12,5 mg hidroklorotiazida.
Zdravilo Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/25 mg vsebuje kinapriljev klorid v količini, ki ustreza 20 mg kinaprila, in 25 mg hidroklorotiazida.
- Druge sestavine zdravila so težki magnezijev subkarbonat, brezvodni kalcijev hidrogenfosfat, predgelirani koruzni škrob, premreženi natrijev karmelozat, magnezijev stearat, hidroksipropilceluloza, hipromeloza, titanov dioksid (E171), makrogol, rumeni železov oksid (E172) in rdeči železov oksid (E172).

Izgled zdravila Kinapril/hidroklorotiazid Actavis in vsebina pakiranja

Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 10 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete: Ovalna, rožnata bikonveksna tableta s prelomno zarezo na obeh straneh in oznako "I" na eni strani. Velikost 4,5 x 8,7 mm.

Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete: Ovalna, rožnata bikonveksna tableta s prelomno zarezo na obeh straneh in oznako "I" na eni strani. Velikost 5,8 x 11,3 mm.

Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/25 mg filmsko obložene tablete: Okrogla, rožnata bikonveksna tableta s prelomno zarezo na obeh straneh in oznako "I" na eni strani. Premer 8,5 mm.

Tablete je mogoče razdeliti na enaki polovici.

Velikosti pakiranj:

Pretisni omoti: 10, 14, 30, 50 in 100 tablet

Plastenke: 100 tablet

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Panrazol:

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandija

Izdelovalec

Actavis hf.

Reykjavíkurvegur 76-78
220 Hafnarfjörður
Íslandíja

To zdravilo je odobreno v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Avstrija	Quinapril HCT Actavis 10/12,5 mg Filmtabletten Quinapril HCT Actavis 20/12,5 mg Filmtabletten Quinapril HCT Actavis 20/25 mg Filmtabletten
Belgija	Quinapril HCTZ Actavis
Bolgarija	Quizicor plus 10/12,5 mg Quizicor plus 20/12,5 mg Quizicor plus 20/25 mg
Češka	Quinapril/Hydrochlorothiazide+pharma 10/12,5 mg Quinapril/Hydrochlorothiazide+pharma 20/12,5 mg Quinapril/Hydrochlorothiazide+pharma 20/25 mg
Grčija	Quinapril/Hydrochlorothiazide Actavis 10/12,5 mg Quinapril/Hydrochlorothiazide Actavis 20/12,5 mg Quinapril/Hydrochlorothiazide Actavis 20/25 mg
Madžarska	Quinanorm Kombi 10/12.5mg tableta Quinanorm Kombi 20/12.5mg tableta Quinanorm Kombi 20/25mg tableta
Íslandíja	Quinapril HCT Actavis
Italija	Quinapril e Idroclorotiazide Actavis/20/12,5 mg compresse rivestite con film
Romunija	Quizicor 10/12.5 mg comprimate filmate Quizicor 20/12.5 mg comprimate filmate Quizicor 20/25 mg comprimate filmate
Slovenija	Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 10 mg/12,5 mg, filmsko obložene tablete Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/12,5 mg filmsko obložene tablet Kinapril/hidroklorotiazid Actavis 20 mg/25 mg filmsko obložene tablete
Slovaška	Quinapril/HCT+pharma 10/12,5 mg Quinapril/HCT+pharma 20/12,5 mg Quinapril/HCT+pharma 20/25 mg
Švedska:	Quinapril/Hydrochlorothiazide Actavis

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 17.11.2014