

Navodilo za uporabo

Cipramil 20 mg koncentrat za raztopino za infundiranje citalopram

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Cipramil in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Cipramil
3. Kako uporabljati zdravilo Cipramil
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Cipramil
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Cipramil in za kaj ga uporabljamo

Kako deluje zdravilo Cipramil

Zdravilo Cipramil je selektivni inhibitor ponovnega privzema serotonina (SSRI – selective serotonin reuptake inhibitor) in spada v skupino zdravil, znanih kot antidepresivi. Ta zdravila pomagajo popraviti nekatera kemična neravnovesja v možganih, ki povzročajo simptome vaše bolezni.

Za kaj uporabljamo zdravilo Cipramil

Zdravilo Cipramil uporabljamo za zdravljenje depresije in kadar se že počutite bolje, pomaga pri preprečevanju povrnitve teh simptomov.

Vaš zdravnik vam lahko zdravilo Cipramil predpiše tudi v kakšen drug namen. Vprašajte svojega zdravnika, če imate v zvezi s tem, zakaj vam je predpisal zdravilo Cipramil, kakršnakoli vprašanja.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Cipramil

Ne jemljite zdravila Cipramil:

- če ste alergični na citalopram ali katerokoli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če jemljete druga zdravila, ki sodijo v skupino imenovano zaviralci monoaminoksidaze (MAOI), vključno s fenelzinom, iproniazidom, izokarboksazidom, nialamidom, tranilciprominom, selegelinom (uporablja se pri zdravljenju Parkinsonove bolezni), moklobemidom (uporablja se za zdravljenje depresije).
- če istočasno jemljete linezolid (antibiotik).
- če imate prirojeno motnjo srčnega ritma oziroma če ste imeli tovrstno epizodo (zabeleženo z EKG preiskavo, namenjeno ocenjevanju delovanja srca).
- če jemljete zdravila za zdravljenje težav s srčnim ritmom ali zdravila, ki lahko vplivajo na srčni ritem (glejte poglavje »Druga zdravila in zdravilo Cipramil«).

Tudi če ste prenehali jemati MAOI, morate počakati dva tedna, preden lahko pričnete zdravljenje z zdravilom Cipramil.

Ko prenehate jemati zdravilo Cipramil, mora preteči en teden, preden vzamete katerega od MAOI.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Prosimo, povejte svojemu zdravniku, če imate še katere druge zdravstvene težave ali bolezni, saj bo moral zdravnik to morda upoštevati pri zdravljenju. Povejte zdravniku še zlasti:

- če imate epizode manije ali panične motnje z intenzivnimi simptomi tesnobe.
- če trpite zaradi jetrne ali ledvične okvare. Zdravnik bo moral morda prilagoditi odmerke.
- če imate sladkorno bolezen. Zdravljenje z zdravilom Cipramil lahko spremeni nadzor koncentracije glukoze. Morda bo potrebno prilagoditi odmerke insulina oziroma peroralnih antiglikemikov.
- če imate epilepsijo. Zdravljenje z zdravilom Cipramil je potrebno prekiniti, če se pojavijo epileptični napadi ali če se poveča njihova pogostnost (glejte tudi poglavje 4. Možni neželeni učinki).
- če imate motnje strjevanja krvi.
- če imate znižano raven natrija v krvi.
- če dobivate elektrokonvulzivno terapijo.
- če se vam pojavi tako imenovani serotoninški sindrom. Nastanek te motnje lahko nakazuje kombinacija simptomov, kot so npr. vznemirjenost, hitro, ritmično tresenje mišic, udov in drugih delov telesa (tremor), sunkoviti in neusklajeni zgibki udov ali trupa zaradi krčenja mišic (mioklonus), vročina (hipertermija).
- če trpite ali ste trpeli zaradi težav s srcem ali ste nedavno imeli srčni napad.
- če imate v mirovanju počasen srčni utrip in/ali če veste, da bi utegnili imeti pomanjkanje soli zaradi dlje časa trajajoče hude driske in bruhanja (slabost) ali uporabe diuretikov (tablet za odvajanje vode).
- če občutite hiter ali nepravilen srčni utrip, omedlevico, kolaps ali omotico, medtem ko stojite, kar lahko kaže na motnjo srčnega utripa.
- če imate težave z razširjenimi očesnimi zenicami (midriazo) ali ste imeli glavkom.

Prosimo, posvetujte se z zdravnikom, tudi če so se gornje navedbe nanašale na vas kadarkoli v preteklosti.

Prosimo bodite pozorni

Nekateri bolniki z manično-depresivno boleznijo lahko preidejo v manično fazo. Za to stanje so značilne nenavadne in hitro menjavajoče se ideje, neumestna veselost in zvečana telesna aktivnost. Če to doživljate, obiščite svojega zdravnika.

V prvih tednih zdravljenja se lahko pojavijo tudi simptomi, kot so nemir ali nezmožnost mirnega sedenja oziroma stanja (akatzija). Če doživljate te simptome, takoj povejte svojemu zdravniku.

Misli na samomor in poslabšanje depresije ali anksiozne motnje

Pri bolnikih z depresijo in/ali anksiozno motnjo se občasno lahko pojavijo misli na samopoškodovanje ali samomor. Po prvi uvedbi zdravljenja z antidepresivi lahko te misli postanejo še hujše, saj ta zdravila začnejo delovati šele čez nekaj časa, običajno čez dva tedna, nekatera pa tudi kasneje.

Pojav takšnih misli je verjetnejši:

- če ste že kdaj razmišljali o samomoru ali samopoškodovanju,
- če ste **mlajša odrasla oseba**. Podatki iz kliničnih preskušanj kažejo, da pri mlajših odraslih (mlajših od 25 let) z motnjami razpoloženja med zdravljenjem z antidepresivi obstaja večje tveganje za pojav samomorilnega vedenja.

Če kadarkoli začnete razmišljati o samopoškodovanju ali samomoru, **se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom ali poiščite pomoč v najbližji bolnišnici.**

Morda bi bilo koristno, če za težave z depresijo ali anksioznostjo **poveste sorodniku ali dobremu prijatelju** in ga prosite, da prebere to navodilo. Prosite ga lahko tudi, da naj vas opozori, če meni, da se je depresija ali anksioznost poslabšala ali ga skrbijo spremembe v vašem vedenju.

Otroci in mladostniki

Zdravilo Cipramil se običajno ne sme uporabiti za otroke in mladostnike, mlajše od 18 let. Vedeti morate tudi, da imajo bolniki, mlajši od 18 let, večje tveganje za neželene učinke, npr. poskus samomora, samomorilne misli in sovražnost (večinoma nasilno vedenje, nasprotovalno vedenje in jezo), ko jemljejo zdravila iz te skupine. Kljub temu, lahko vaš zdravnik predpiše zdravilo Cipramil za bolnike, mlajše od 18 let, če se odloči, da je to najboljše za bolnika. Če je vaš zdravnik predpisal zdravilo Cipramil za bolnika, mlajšega od 18 let, in se želite pogovoriti o tem, se vrnite k zdravniku. Če se pojavi ali poslabša katerikoli od navedenih simptomov pri bolnikih, ki so mlajši od 18 let in jemljejo zdravilo Cipramil, morate obvestiti svojega zdravnika. Poleg tega za zdravilo Cipramil še niso dokazani varnostni učinki na dolgi rok v zvezi z rastjo, dozorevanjem, kognitivnim in vedenjskim razvojem v tej starostni skupini.

Druga zdravila in zdravilo Cipramil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Nekatera zdravila lahko vplivajo na delovanje drugih, kar lahko včasih povzroča resne neželene učinke.

Povejte svojemu zdravniku, če jemljete katerokoli izmed naslednjih zdravil:

- Zaviralce monoaminskidaže (MAOI), kamor med drugimi uvrščamo tudi zdravilne učinkovine fenelzin, iproniazid, isokarboksazid, nialamid ali tranilcipromin. Če jemljete katero izmed zdravil iz te skupine, je potrebno počakati 14 dni, preden začnete jemati zdravilo Cipramil. Po prenehanju jemanja zdravila Cipramil je potrebno počakati 7 dni, preden začnete jemati katero od navedenih zdravil.
- "Reverzibilne selektivne zaviralce MAO-A", ki vsebujejo moklobemid (uporabljamo ga za zdravljenje depresije).
- Antibiotik linezolid.
- Litij (uporabljamo ga za preprečevanje in zdravljenje bipolarnе motnje oziroma manično-depresivne motnje) in triptofan.
- Imipramin in desipramin (zdravili za zdravljenje depresije).
- "Ireverzibilne zaviralce MAO-B", ki vsebujejo selegilin (uporabljamo ga za zdravljenje Parkinsonove bolezni). Ta zdravila povečajo tveganje za neželene učinke. Odmerki selegilina ne smejo presegati 10 mg dnevno.
- Metoprolol (uporabljamo ga za zdravljenje visokega krvnega tlaka in/ali srčnih obolenj). Koncentracija metoprolola v krvi je povišana, vendar pa niso bili zabeleženi znaki povečanega učinka ali neželeni učinki metoprolola.
- Sumatriptan in podobna zdravila (uporabljamo jih za zdravljenje migrene), tramadol (uporabljamo ga proti hudim bolečinam) ter oksitriptan povečajo tveganje za neželene učinke. Če dobite nenavadne simptome ob uporabi teh zdravil, morate obiskati svojega zdravnika.
- Cimetidin v visokih odmerkih (uporabljamo ga za zdravljenje želodčne razjede). Priporočljiva je previdnost pri uporabi velikih odmerkov citaloprama v kombinaciji z velikimi odmerki cimetidina.
- Zdravila, za katere je znano, da imajo učinke na funkcije trombocitov (npr. nekatera antipsihotična zdravila, acetilsalicilna kislina (uporabljamo za zdravljenje bolečin), nesteroidna protivnetna zdravila (uporabljamo jih za zdravljenje revmatičnih obolenj) in antikoagulantni (zdravila namenjena preprečevanju strjevanja krvi)). Ob hkratni uporabi z zdravilom Cipramil se nekoliko poveča tveganje za pojav krvavitev.
- Šentjanževka (*Hypericum perforatum*) – zeliščni pripravek, ki ga uporabljamo proti depresiji. Ob hkratni uporabi z zdravilom Cipramil se lahko poveča možnost neželenih učinkov.
- Meflokin (za zdravljenje malarije), bupropion (za zdravljenje depresije) in tramadol (za lajšanje hudih bolečin) zaradi možnega tveganja za znižanje praga za pojav epileptičnih napadov.
- Nevroleptike (zdravila za zdravljenje shizofrenije, psihoz) zaradi možnega tveganja za znižanje praga za pojav epileptičnih napadov in antidepresive.
- Zdravila, ki podaljšajo interval QT (nenormalen elektrokardiogram), in zdravila, ki povzročajo znižanje koncentracije kalija oziroma magnezija (zdravila, ki povzročajo hipokaliemijo oz. hipomagneziemijo).
- Zdravila za zdravljenje težav s srčnim ritmom ali zdravila, ki bi lahko vplivala na srčni ritem, npr. kot so antiaritmiki razreda IA in III, antipsihotiki (npr. derivati fenotiazina, pimoizid, haloperidol),

triciklični antidepresivi, določena antimikrobna sredstva (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin IV, pentamidin, zdravila proti malariji, zlasti halofantrin), določeni antihistaminiki (astemizol, mizolastin).

- Zdravila, ki zmanjšajo koncentracijo kalija ali magnezija v krvi, kar lahko poveča tveganje za življenjsko nevarno motnjo srčnega ritma.

Zdravilo Cipramil skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

Zdravilo Cipramil lahko jemljete s hrano ali brez nje (glejte poglavje 3. Kako jemati zdravilo Cipramil).

Zdravilo Cipramil dokazano ne okrepi učinkov alkohola. Kljub temu pitje alkohola med zdravljenjem z zdravilom Cipramil ni priporočljivo.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Obvestite svojega zdravnika, če ste noseči ali načrtujete zanositev. Nosečnice običajno ne smejo jemati zdravila Cipramil, matere pa med zdravljenjem z zdravilom Cipramil ne smejo dojiti, razen če ste se o možni koristnosti in tveganjih prej pogovorili s svojim zdravnikom.

Če jemljete zdravilo Cipramil v zadnjem trimesečju nosečnosti, morate vedeti, da se lahko pri novorojenčku pojavijo naslednji učinki: težave z dihanjem, modrikasta koža, krči, spremembe telesne temperature, težave s hranjenjem, bruhanje, nizka raven krvnega sladkorja, toge ali mlahave mišice, živahni refleksi, tremor, podrhtavanje, vzdražljivost, otopelost, neprestan jok, zaspanost in težave s spanjem. Če se pri novorojenčku pojavi kateri od teh simptomov, takoj obiščite zdravnika.

Obvestite babico in/ali zdravnika, če se zdravite z zdravilom Cipramil. Če zdravila, kot je zdravilo Cipramil jemljete med nosečnostjo, zlasti v zadnjih treh mesecih nosečnosti, se lahko pri dojenčku poveča tveganje za resno bolezen, ki se imenuje perzistentna pljučna hipertenzija pri novorojenčkih (PPHN - persistent pulmonary hypertension in the newborn), pri kateri dojenček diha hitreje in postane modrikast. Ti simptomi običajno nastopijo v prvih 24 urah po rojstvu. Če se to zgodi vašemu dojenčku, takoj obvestite babico in/ali zdravnika.

Študije na živalih so pokazale, da citalopram zmanjša kakovost sperme. Teoretično bi to lahko vplivalo na plodnost, vendar vpliv na plodnost pri človeku še ni bil opažen.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Cipramil ima majhen ali zmeren vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. V primeru, da se v začetku zdravljenja počutite omotični ali zaspani, ne smete voziti motornih vozil ali upravljati nevarnih strojev, vse dokler ti učinki ne minejo.

Zdravilo Cipramil vsebuje natrij

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar v bistvu pomeni 'brez natrija'.

3. Kako jemati zdravilo Cipramil

Kakšen odmerek vzeti

Zdravilo vam bo dal zdravnik ali medicinska sestra.

Zdravilo Cipramil dajemo vsak dan.

Odrasli

Običajno bo zdravnik predpisal med 20 in 40 mg dnevno.

Koncentrat zdravila Cipramil bo razredčen v 250 ml ustrezne raztopine (0,9 % sterilne raztopine soli ali 5 % sterilne raztopine sladkorja), nato pa bo počasi vstopal v vašo veno skozi iglo oziroma cevko, povezano s kapalko z infuzijo. Običajno boste dobili 20 mg zdravila Cipramil na uro.

Starejši bolniki (nad 65 let starosti)

Začetni odmerek je treba zmanjšati na polovico priporočenega odmerka, npr. na 10-20 mg dnevno. Starejši bolniki običajno ne smejo prejeti več kot 20 mg na dan.

Bolniki s posebnim tveganjem

Bolniki z jetrnimi težavami ne smejo prejeti več kot 20 mg na dan.

Otroci in mladostniki (< 18 let)

Zdravila Cipramil ne smemo dajati otrokom in mladostnikom. Za dodatne informacije glejte poglavje 2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Cipramil.

Trajanje zdravljenja

Zdravljenje z zdravilom Cipramil, koncentrat za raztopino za infundiranje običajno traja 10-14 dni.

Zdravljenje se običajno nadaljuje s tabletami zdravila Cipramil.

Morda bo minilo več dni, preden boste občutili ugodne učinke zdravljenja, kar je za to vrsto zdravila običajno.

Pomembno je, da dokončate potek zdravljenja natančno tako, kot vam je predpisal zdravnik.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Cipramil, kot bi smeli

Zdravilo vam bo dal zdravnik oziroma medicinska sestra.

V malo verjetnem primeru, da dobite preveč citaloprama, boste morda občutili nekatere od spodaj naštetih neželenih učinkov. Zdravnik oziroma medicinska sestra bosta uvedla simptomatično in podporno zdravljenje.

Nekateri znaki prekomernega odmerka so lahko smrtno nevaren nepravilen srčni utrip, epileptični napadi, sprememba srčnega ritma, zaspanost, koma, bruhanje, tremor (hitro, ritmično tresenje mišic, udov in drugih delov telesa), znižan krvni tlak, zvišan krvni tlak, siljenje na bruhanje (občutek slabosti), serotoniniski sindrom (glejte poglavje 4. Možni neželeni učinki), vznemirjenost, omotica, razširjene očesne zenice, potenje, modrikasta koža in hiperventilacija (prehitro in/ali pregloboko dihanje).

Če ste prenehali uporabljati zdravilo Cipramil

Ne prenehajte uporabljati zdravila Cipramil, dokler vam tega ne naroči zdravnik. Ko zaključite potek zdravljenja, je na splošno priporočeno postopno zniževanje odmerka zdravila Cipramil, ki naj traja nekaj tednov.

Hitro prenehanje jemanja zdravila lahko povzroči blage in prehodne odtegnitvene simptome, kot so omotičnost, mravljinčenje, motnje spanja (žive sanje, nočne more, nezmožnost spanja), tesnoba, glavobol, slabost (siljenje na bruhanje), bruhanje, potenje, nemir oziroma vznemirjenost, tremor, zmedenost oziroma dezorientiranost, čustvena občutljivost oziroma razdražljivost, driska (redko blato), motnje vida, drgetanje ali razbijanje srca (palpitacije).

Ko zaključujete zdravljenje je torej priporočljivo postopno nekajtedensko nižanje odmerka, ne pa nenadna prekinitvev.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki običajno izginejo po nekaj tednih zdravljenja. Prosimo, ne pozabite, da so nekateri učinki morda le simptomi vaše bolezni in bodo z izboljšanjem počutja minili.

Nekateri bolniki so navajali naslednje resne neželene učinke. Če se pojavi kateri izmed naslednjih simptomov, morate takoj prenehati z jemanjem zdravila Cipramil in nemudoma obiskati svojega zdravnika:

- visoka temperatura, vznemirjenost, zmedenost, tresenje ali nenadno krčenje mišic; to so lahko znaki redkega stanja, ki se imenuje serotoniniski sindrom, ki se lahko pojavi pri kombinirani uporabi antidepressivov;
- če začutite otekanje kože, jezika, ustnic ali obraza ali če težko dihate ali požirate (alergična reakcija);
- neobičajne krvavitve, vključno s krvavitvami v prebavilih;
- hiter, nepravilen srčni utrip in omedlevica, ki sta lahko simptoma smrtno nevarnega bolezenskega stanja, znanega kot torsade de pointes.

Redki, a resni neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

Če se pojavi kateri izmed naslednjih simptomov, morate takoj prenehati z jemanjem zdravila Cipramil in nemudoma obiskati svojega zdravnika:

- hiponatriemija: nizka koncentracija natrija v krvi, kar lahko povzroči utrujenost, zmedenost in trzanje mišic.

Naslednji neželeni učinki so pogosto blagi in običajno minejo po nekajdnevem zdravljenju. Bodite pozorni, ker so številni spodaj navedeni neželeni učinki lahko simptomi vaše bolezni, ki izzvenijo, ko se pričnete bolje počutiti.

Če so neželeni učinki neprijetni ali trajajo več kot le nekaj dni, povejte to svojemu zdravniku.

Suha usta povečajo tveganja za razvoj zobne gnilobe. Zato si torej morate zobe čistiti bolj pogosto kot običajno.

Zelo pogosti (pojavi se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- zaspanost
- nespečnost
- povečano potenje
- suha usta
- siljenje na bruhanje (občutek slabosti)
- glavobol

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- zmanjšan tek
- vznemirjenost
- zmanjšana spolna sla
- tesnoba
- živčnost
- zmedenost
- nenavadne sanje
- tremor (hitro, ritmično tresenje mišic, udov in drugih delov telesa)
- mravljinčenje ali odrevenelost v dlaneh ali stopalih
- omotica
- motnje pozornosti
- zvonjenje v ušesih
- zehanje
- driska
- bruhanje
- zaprtje
- srbenje
- bolečine v mišicah in sklepih
- težave z ejakulacijo in erekcijo pri moških
- nezmožnost doseganja orgazma pri ženskah
- utrujenost
- ščemenje kože
- zmanjšanje telesne mase

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- podkožne krvavitve (hiter nastanek modric)
- povečan tek
- napadalnost
- depersonalizacija (motnja samozavedanja, razosebljenje)
- halucinacije
- manija
- omedlevica
- razširjene očesne zenice
- hiter srčni utrip
- počasen srčni utrip
- koprivnica
- izpadanje las in dlak
- kožni osip
- občutljivost na svetlobo
- težave pri mokrenju
- premočna menstruacija
- otekanje rok in nog
- povečanje telesne mase

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- krči, ki se kažejo s hudim tresenjem dela telesa ali celega telesa
- nehotni gibi
- motnje okusa
- krvavitve
- vnetje jeter
- vročina

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- samomorilne misli ali samomorilno vedenje, glejte tudi poglavje »Opozorila in previdnostni ukrepi«
- znižanje števila krvnih ploščic, kar poveča tveganje za krvavitve ali modrice
- preobčutljivost (kožni osip)
- resna alergijska reakcija, kar povzroča težave z dihanjem in omotico
- neustrezno izločanje antidiuretičnega hormona
- hipokaliemija: nizka raven kalija v krvi, kar lahko povzroči mišično šibkost, trzanje ali nenormalen srčni utrip
- panični napad
- škripanje z zobmi
- nemir
- neobičajni mišični gibi ali togost
- akatizija (nehotni mišični gibi)
- motnje vida
- omotica ob vstajanju zaradi nizkega krvnega pritiska (ortostatična hipotenzija)
- krvavitve iz nosu
- motnje s krvavitvami, vključno kožne in sluznične krvavitve (ekhimoza)
- nenadno otekanje kože ali sluznice
- boleča erekcija
- iztekanje mleka pri moških in ženskah, ki ne dojijo
- neredne krvavitve iz maternice
- neobičajne vrednosti jetrnih testov
- nenormalen elektrokardiogram (podaljšanje intervala QT v EKG-ju)

Povečano tveganje za zlome kosti so opazili pri bolnikih, ki jemljejo zdravila iz skupine SSRI, kamor spada tudi zdravilo Cipramil.

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo.

5. Shranjevanje zdravila Cipramil

Običajno bo zdravilo za vas shranil zdravnik ali medicinska sestra.

Če ga hranite doma:

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo Cipramil shranjujte pri temperaturi do 25°C. Ampule hranite v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnin, ali če opazite znake razbarvanja.

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Po redčenju je treba zdravilo uporabiti v 6 urah.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Cipramil

Zdravilna učinkovina je citalopram.

0,5 ml koncentrata za raztopino za infundiranje (1 ampula) vsebuje 20 mg citaloprama v obliki 22,24 mg citalopramijevega klorida.

Pomožni snovi:

- natrijev klorid
- voda za injekcije

Izgled zdravila Cipramil in vsebina pakiranja

Zdravilo Cipramil 20 mg koncentrat za raztopino za infundiranje je v brezbarvnih steklenih ampulah. Škatla s 5 ampulami po 0,5 ml.

Način in režim izdaje zdravila Cipramil

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Lundbeck Pharma d.o.o.
Titova cesta 8
2000 Maribor
Slovenija

Izdelovalec

H. Lundbeck A/S
Ottliavej 9
2500 Valby

Danska

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne
24.04.2013