

NAVODILO ZA UPORABO

Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete **Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete**

kalijev losartanat/hidroklorotiazid

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva
3. Kako jemati zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva je kombinacija antagonista angiotenzina II (losartana) in diuretika (hidroklorotiazida).

Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva se uporablja za zdravljenje esencialne hipertenzije (visokega krvnega tlaka).

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva

Ne jemljite zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva

- če ste alergični na losartan, hidroklorotiazid ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če ste alergični na druge derivate sulfonamida (npr. druge tiazide, nekatera protibakterijska zdravila, kot je ko-trimoksazol; če niste prepričani, vprašajte zdravnika).
- če imate hudo okvaro jeter.
- če imate hudo okvaro ledvic ali vaše ledvice ne tvorijo urina.
- če imate nizko vrednost kalija, nizko vrednost natrija ali visoko vrednost kalcija, ki se jih ne da pozdraviti.
- če imate protin.
- če ste noseči več kot 3 mesece (v tem primeru se je bolje izogniti jemanju zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva, glejte poglavje 2: "Nosečnost, dojenje in plodnost").
- če imate sladkorno bolezen ali okvarjeno delovanje ledvic in se zdravite z zdravilom za zniževanje krvnega tlaka, ki vsebuje aliskiren.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če so vam kdaj otekali obraz, ustnice, žrelo ali jezik.
- če jemljete diuretike (tablete za odvajanje vode).
- če ste na dieti s hrano z zmanjšano količino soli.
- če ste močno bruhal in/ali imeli hudo drisko.
- če imate srčno popuščanje.
- če imate zožane arterije, ki vodijo do ledvic (stenoza ledvične arterije) ali vam deluje samo ena ledvica ali pa so vam pred kratkim presadili ledvico.
- če imate zožane arterije (ateroskleroza), angino pectoris (bolečino v prsnem košu zaradi šibkega delovanja srca).
- če imate stenozo aortne ali mitralne zaklopke (zožitev srčnih zaklopk) ali hipertrofično kardiomiopatijo (bolezen, ki povzroča zadebelitev srčne mišice).
- če imate sladkorno bolezen.
- če imate protin.
- če imate ali ste imeli alergijo, astmo ali bolezen, ki povzroča bolečine v sklepih, kožne izpuščaje in zvišano telesno temperaturo (sistemski eritematozni lupus).
- če imate visoko vrednost kalcija ali nizko vrednost kalija ali ste na dieti z zmanjšanim vnosom kalija.
- če boste morali dobiti anestezijo (tudi pri zobozdravniku) ali boste operirani, ali greste na teste delovanja obščitnične žleze, morate zdravniku ali medicinskemu osebju povedati, da jemljete tablete s kalijevim losartanom in hidroklorotiazidom.
- če imate primarni hiperaldosteronizem (sindrom, povezan s povečanim izločanjem hormona aldosterona iz nadledvične žleze, zaradi okvare znotraj žleze).
- če ste noseči, mislite, da ste noseči (ali nameravate zanositi) morate povedati vašemu zdravniku. Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva v zgodnjem obdobju nosečnosti ni priporočljivo in ga ne smete jemati, če ste noseči že 3 mesece, kar bi lahko povzročilo resne okvare pri vašem otroku (glejte poglavje 2: "Nosečnost, dojenje in plodnost").
- če jemljete katero od naslednjih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka:
 - zaviralec ACE (na primer enalapril, lizinopril ali ramipril), zlasti če imate kakšne težave z ledvicami, ki so povezane s sladkorno boleznijo,
 - aliskiren.

Zdravnik vam bo morda v rednih presledkih kontroliral delovanje ledvic, krvni tlak in količino elektrolitov (npr. kalija) v krvi.

Glejte tudi informacije pod naslovom "Ne jemljite zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva".

Otroci in mladostniki

Izkušenj z uporabo zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva pri otrocih nimamo. Zato se zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva otrokom ne sme dajati.

Druga zdravila in zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo, vključno z zdravili, ki se dobijo brez recepta.

Diuretiki, kot je hidroklorotiazid, ki ga vsebuje zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva, lahko medsebojno delujejo z drugimi zdravili. Pripravki, ki vsebujejo litij, se v kombinaciji z zdravilom Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva brez natančnega nadzora zdravnika ne sme uporabljati. Posebni previdnostni ukrepi (npr. krvi testi) so potrebni, če jemljete dodatke kalija, nadomestke soli, ki vsebujejo kalij ali zdravila, ki zadržujejo kalij, druge diuretike (zdravila za odvajanje vode), nekatera odvajala, glicerizin (najdete ga v sladkem korenu) zdravila proti protinu, zdravila za nadzor srčnega ritma ali zdravila proti sladkorni bolezni (peroralna zdravila ali insulin). Pomembno je, da vaš zdravnik ve, če jemljete še druga zdravila za zniževanje krvnega tlaka, steroide, zdravila za zdravljenje raka, zdravila za bolečine, zdravila za zdravljenje glivičnih okužb, zdravila proti artritisu, smole za zdravljenje povišanega holesterola, kot je holestiramin, zdravila za sprostitvev

mišic, uspavala, opioidna zdravila kot je morfin, presorni amini, kot je adrenalin ali druga zdravila iz iste skupine.

Zdravnik vam bo morda moral spremeniti odmerek in/ali upoštevati druge previdnostne ukrepe: Če jemljete zaviralec ACE ali aliskiren (glejte tudi informacije pod naslovoma "Ne jemljite zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva" in "Opozorila in previdnostni ukrepi").

Če boste imeli preiskavo z jodirnim kontrastnim sredstvom, zdravniku povejte, da jemljete zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva.

Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

Svetujemo, da med zdravljenjem s tem zdravilom ne uživajte alkohola: alkohol in Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva si lahko medsebojno povečujeta učinek.

Velike količine soli v prehrani lahko zmanjšuje učinek zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva.

Izogibajte se hrani in pijači, ki vsebuje sladki koren, saj glicerizin, ki se nahaja v sladkem korenu, lahko povzroči nenormalne vrednosti elektrolitov v krvi.

Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva lahko jemljete s hrano brez nje.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Zdravniku morate povedati če mislite, da ste noseči ali če lahko zanosite. Zdravnik vam bo praviloma svetoval, da prenehate jemati zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva, še preden zanosite ali takoj, ko izveste, da ste noseči. Praviloma vam bo svetoval, da namesto zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva jemljete drugo zdravilo. Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva v nosečnosti ni priporočljivo, po tretjem mesecu nosečnosti pa se ne sme jemati, saj lahko po tretjem mesecu nosečnosti povzroči resno škodo vašemu otroku.

Dojenje

Zdravniku morate povedati, če dojite ali nameravate dojiti. Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva se ne priporoča doječim materam in vaš zdravnik vam bo morda predpisal drugo zdravilo, če bi želeli dojiti.

Starejše osebe

Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva enako dobro deluje pri večini starejših in mlajših bolnikov. Oboji ga tudi enako dobro prenašajo. Večina starejših bolnikov potrebuje enak odmerek kot mlajši bolniki.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Na začetku zdravljenja s tem zdravilom ne opravljajte opravil, ki zahtevajo posebno pozornost (na primer vožnje avtomobila ali upravljanje nevarnih strojev) dokler ne veste, kako zdravilo prenašate.

Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva vsebuje laktozo

Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva vsebuje laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zdravnik vam bo predpisal ustrezen odmerek zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva glede na vaše stanje in glede na to, ali jemljete še katera druga zdravila. Pomembno je, da nadaljujete z jemanjem zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva tako dolgo, kot vam je predpisal zdravnik. Tako vzdržujete enakomeren nadzor krvnega tlaka.

Visok krvni tlak

Priporočeni odmerek zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva za večino bolnikov z visokim krvnim tlakom je 1 tableta Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5 mg na dan za 24-urni nadzor krvnega tlaka. Odmerek se lahko poveča na 2 filmsko obloženi tableti losartan/hidroklorotiazid 50 mg/12,5 mg enkrat na dan ali eno tableto losartan/hidroklorotiazid 100 mg/25 mg (večja jakost) na dan. Največji dnevni odmerek sta dve filmsko obloženi tableti losartan/hidroklorotiazid 50 mg/12,5 mg na dan ali ena filmsko obložena tableta losartan/hidroklorotiazid 100 mg/25 mg na dan.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva, kot bi smeli

V primeru prevelikega odmerjanja, se takoj posvetujte z zdravnikom, da lahko takoj dobite ustrezno zdravniško pomoč. Prevelik odmerek lahko povzroči padec krvnega tlaka, palpitanje (neprijetni občutki ob hitrem ali močnem utripanju srca), počasen utrip, spremembe v sestavi krvi in dehidracijo.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva

Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva poskusite jemati tako, kot vam je predpisal zdravnik. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Nadaljujte z običajnim jemanjem.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva takoj prenehajte jemati in se posvetujte z zdravnikom ali pa, pojdite v najbližjo bolnišnico, če se pri vas pojavi kaj od sledečega:

Huda alergijska reakcija (izpuščaj, srbenje, otekanje obraza, ustnic, ust ali grla, ki lahko povzroča težave s požiranjem ali dihanjem). To je resen, toda redek neželeni učinek, ki se lahko pojavi pri več kot 1 od 10.000 bolnikov, vendar manj kot pri 1 od 1.000 bolnikov. V takšnem primeru je lahko potrebna nujna zdravniška pomoč ali bolnišnično zdravljenje.

Poročali so naslednjih neželenih učinkih.

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov

- kašelj, okužbe zgornjih dihalnih poti, zamašen nos, sinusitis (vnetje sinusov), težave s sinusi
- diareja, bolečine v trebuhu, slabost, prebavne motnje
- mišične bolečine ali krči, bolečine v nogah, bolečine v hrbtu
- nespečnost, glavobol, omotica
- šibkost, utrujenost, bolečine v prsih
- povečanje ravni kalija (kar lahko povzroči nepravilen srčni ritem), zmanjšanje ravni hemoglobina

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

- slabokrvnost, rdeče ali rjavkaste pike na koži (včasih zlasti na stopalih, nogah, rokah in zadnjici, z bolečinami v sklepih, otekanjem dlani in stopal ter bolečino v trebuhu), modrice, zmanjšanje števila belih krvnih celic, težave s strjevanjem krvi
- izguba apetita, povečanje ravni sečne kisline ali izražen protin, povečanje ravni krvnega sladkorja, nepravilne vrednosti elektrolitov v krvi

- tesnoba, živčnost, panične motnje (ponavljajoči se panični napadi), zmedenost, depresija, neobičajne sanje, motnje spanja, zaspanost, motnje spomina
- mravljinčenje ali podobni občutki, bolečine v udih, tresenje, migrena, omedlevica
- zamegljen vid, pekoč občutek ali zbadanje v očeh, konjunktivitis, poslabšanje vida, rumeno obarvan vid
- zvonjenje, brenčanje, bučanje ali tleskanje v ušesih
- nizek krvni tlak, ki se lahko pojavlja ob spremembah položaja telesa (občutek vrtoglavosti ali šibkosti ob vstajanju), angina pectoris (bolečine v prsih), nepravilen srčni utrip, možgansko-žilni dogodki (prehodni ishemični napadi, »mala možganska kap«), srčni napad, palpitacije (neprijetni občutki ob hitrem ali močnem utripanju srca)
- vnetje žil, ki ga pogosto spremljajo izpuščaji na koži ali modrice
- boleče grlo, zasoplost, bronhitis, pljučnica, voda v pljučih (ki povzroča težave z dihanjem), krvavitve iz nosu, izcedek iz nosu, zamašen nos
- zaprtost, driska, vetrovi, razdražen želodec, želodčni krči, slabost, bruhanje, suha usta, vnetje žlez ustnih slinavk, zobobol
- zlatenica (porumenelost oči in kože), vnetje trebušne slinavke
- koprivnica, srbenje, vnetje kože, izpuščaji, rdečica na koži, občutljivost na svetlobo, Lyellov sindrom (videz opekline in oluščene kože), suha koža, vročinski oblivi, potenje, izguba las
- bolečine v rokah, ramah, kolkih, kolenih ali drugih sklepih, otekanje sklepov, okorelost, šibkost mišic
- pogosto uriniranje, tudi ponoči, nepravilno delovanje ledvic vključno z vnetjem ledvic, okužbe sečil, sladkor v urinu
- zmanjšanje libida, impotenca
- otekanje obraza, zvišana telesna temperatura

Redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov

- hepatitis (vnetje jeter), abnormalni rezultati testov delovanja jeter

Neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

- motnje mišične okvare, ki lahko povzročijo težave z ledvicami
- motnje okušanja (disgevizija)

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika,

Center za zastrupitve,

Zaloška cesta 2,

SI-1000 Ljubljana,

faks: + 386 (0)1 434 76 46,

e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si.

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake »EXP:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva

Zdravilni učinkovini sta kalijev losartanat in hidroklorotiazid.

Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 50 mg kalijevega losartanata in 12,5 mg hidroklorotiazida.

Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg kalijevega losartanata in 25 mg hidroklorotiazida.

Druge sestavine zdravila so:

Jedro: laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza (E460a), predgelirani koruzni škrob, magnezijev stearat (E572)

Filmska obloga: polivinilalkohol, titanov dioksid (E171), makrogol 3350, smukec (E553b), rumeni železov oksid (E172)

Izgled zdravila Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva in vsebina pakiranja

Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete so rumene, ovalne, obojestransko izbočene filmsko obložene tablete z oznakama »5« in »0« na eni strani ter razdelilno zarezo na obeh straneh.

Tableta se lahko deli na enake odmerke.

Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete so rumene, ovalne, obojestransko izbočene filmsko obložene tablete z oznakama »1« in »00« na eni strani ter razdelilno zarezo na obeh straneh.

Tableta se lahko deli na enake odmerke.

Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete so na voljo v pakiranjih po 1, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 in 100 filmsko obloženih tablet, koledarskem pakiranju po 28 filmsko obloženih tablet ter bolnišničnih pakiranjih po 50 (50 x 1) in 280 (10 x 28) filmsko obloženih tablet in v HDPE platenkah z navojno zaporko, na kateri je vidno odpiranje: 100 in 250 filmsko obloženih tablet.

Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete so na voljo so v pakiranjih po 1, 7, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 in 100 filmsko obloženih tablet, koledarskih pakiranjih po 7 ali 28 filmsko obloženih tablet ter bolnišničnih pakiranjih po 50 (50 x 1) in 280 (10 x 28) filmsko obloženih tablet in v HDPE platenkah z navojno zaporko, na kateri je vidno odpiranje: 30 in 100 filmsko obloženih tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nizozemska

Izdelovalci

Teva UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN229AG
Velika Britanija

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem
Nizozemska

Teva Santé SAS
Rue Bellocier, 89107 Sens
Francija

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen
Madžarska

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllo
Madžarska

Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, indication number 305
747 70 Opava-Komárov
Česka

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren
Nemčija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija	Losartan/HCT ratiopharm GmbH 50/12.5 mg Filmtabletten Losartan/HCT ratiopharm GmbH 100/25 mg Filmtabletten
Belgija	Co-Losartan TEVA 50 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten Co-Losartan TEVA 100/25 mg filmomhulde tabletten
Česka	Giovax Plus H 50 mg/12,5 mg, potahované tablety Giovax Plus H 100/25 mg, potahované tablety
Danska	Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva 50/12,5 mg Filmovertrukne tabletter Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva 100/25 mg Filmovertrukne tabletter
Finska	Losatrix Comp 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losatrix Comp 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit
Francija	LOSARTAN/HCTZ Teva 50mg/12.5 mg, comprimé pelliculé LOSARTAN/HCTZ Teva 100/25 mg, comprimé pelliculé
Nemčija	Losartan comp. AbZ 50mg/12,5 mg Filmtabletten Losartan comp. AbZ 100/25 mg Filmtabletten
Madžarska	Co-Arbartan 50 mg/12.5 mg filmtabletta Co-Arbartan 100/25 mg filmtabletta
Irska	Losartan/hydrochlorothiazide TEVA 50/12.5 mg Film-coated Tablets

Italija	Losartan/hydrochlorothiazide TEVA 100/25 mg Film-coated Tablets Losartan/Idroclorotiazide TEVA 50/12,5 mg compresse rivestite con film
Nizozemska	Losartan/Idroclorotiazide TEVA 100/25 mg compresse rivestite con film Losartankalium/HCT 50/12.5 PCH, filmomhulde tabletten 50/12, 5mg Losartankalium/HCT 100/25 PCH, filmomhuld tabletten 100/25 mg
Norveška	Losartan Potassium/HCTZ Tablets 50/12.5 mg Losartan Potassium/HCTZ Tablets 100/25 mg
Portugalska	Losartan Potassium/HCTZ Tablets 50/12.5 Losartan Potassium/HCTZ Tablets 100/25
Slovenija	Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete Kalijev losartanat/hidroklorotiazid Teva 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
Španija	Losartán/Hidroclorotiazida Teva 50/12,5 mg comprimidos EFG Losartán/Hidroclorotiazida Teva 100/25 mg comprimidos EFG
Švedska	Losartan-Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Losartan-Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter
Velika Britanija	Losartan potassium and Hydrochlorothiazide 50 mg/12. mg Film-coated tablets Losartan potassium and Hydrochlorothiazide 100 mg/25 mg Film-coated tablets

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 04.12.2015.