

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO

Ropinirol Actavis 0,25 mg filmsko obložene tablete
Ropinirol Actavis 0,5 mg filmsko obložene tablete
Ropinirol Actavis 1 mg filmsko obložene tablete
Ropinirol Actavis 2 mg filmsko obložene tablete
Ropinirol Actavis 3 mg filmsko obložene tablete
Ropinirol Actavis 4 mg filmsko obložene tablete
Ropinirol Actavis 5 mg filmsko obložene tablete

ropinirol

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Ropinirol Actavis in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Ropinirol Actavis
3. Kako jemati zdravilo Ropinirol Actavis
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Ropinirol Actavis
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Ropinirol Actavis in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Ropinirol Actavis spada v skupino zdravil, imenovanih agonisti dopamina. Agonisti dopamina delujejo tako kot naravna snov v možganih, imenovana dopamin.

Zdravilo Ropinirol Actavis uporabljamo za zdravljenje Parkinsonove bolezni. Vzrok Parkinsonove bolezni je pomanjkanje posebne snovi, dopamina, v možganih. Zdravilo Ropinirol Actavis lahko uporabljamo samo ali skupaj z drugimi zdravili proti Parkinsonovi bolezni za njeno učinkovitejšo zdravljenje.

Zdravilo Ropinirol Actavis v jakostih 0,25, 0,5, 1, 2, 3 in 4 mg uporabljamo tudi za zdravljenje simptomov zmerne do hudega idiopatskega sindroma nemirnih nog. Za to motnjo je značilna nepremagljiva potreba po premikanju nog in, v nekaterih primerih, rok. To potrebo po navadi spremljajo neprijetni občutki, npr. mravljinčenje, pekoč občutek ali zbadanje. Takšni občutki se pojavijo med obdobji mirovanja ali nedejavnosti, npr. med sedenjem ali ležanjem, še zlasti v postelji, ter so hujši zvečer ali ponoči. Po navadi prinese olajšanje le hoja ali premikanje prizadetih udov, zato imajo bolniki pogosto težave s spanjem. Zdravilo Ropinirol Actavis odpravlja nelagodje in zmanjša potrebo po premikanju udov, ki moti nočni počitek.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Ropinirol Actavis

Ne jemljite zdravila Ropinirol Actavis

- če ste alergični (preobčutljivi) na zdravilno učinkovino ropinirol ali katerokoli sestavino zdravila Ropinirol Actavis,
- če imate bolezen jeter,
- če imate resno bolezen ledvic.

Če ste negotovi, se morate nujno posvetovati z zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja tega zdravila morate zdravniku povedati:

- če imate kakšne resne težave s srcem,
- če imate kakšne resne težave z duševnim zdravjem,
- če obstajajo znaki, da ste obsedeni s patološkim hazardiranjem ali pretirano željo po spolnosti.

V takšnih okoliščinah mora zdravnik natančno nadzirati vaše zdravljenje.

Obvestite svojega zdravnika, če opazite vi ali vaša družina/negovalec, da se pri vas med uporabo zdravila Ropinirol Actavis razvija nagib ali želja po vedenju, ki za vas ni običajno, in se ne morete upreti impulzu, težnji ali skušnjavi po dejanjih, ki bi lahko škodila vam ali drugim. To so motnje nadzora impulzov, kamor štejemo vedenja, kot so odvisnost od hazardiranja, čezmerno uživanje hrane ali trošenje denarja, nenormalno povečan libido ali pretirano ukvarjanje s spolnostjo ter okrepitev misli na spolnost in spolnih občutkov. Zdravnik vam bo morda moral prilagoditi zdravljenje.

Če se vam simptomi med zdravljenjem sindroma nemirnih nog poslabšajo, se začnejo bolj zgodaj v teku dneva ali hitreje med počitkom, ali prizadenejo druge dele telesa, npr. roke, se morate posvetovati z zdravnikom. Morda vam bo prilagodil odmerek zdravila Ropinirol Actavis, ki ga jemljete.

Zdravniku morate povedati, če med jemanjem zdravila Ropinirol Actavis začnete kaditi ali opustite kajenje. Morda vam bo moral prilagoditi odmerek zdravila Ropinirol Actavis.

Otroci in mladostniki

Zdravilo Ropinirol Actavis ni priporočljivo za otroke in mladostnike mlajše od 18 let.

Druga zdravila in zdravilo Ropinirol Actavis

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. To velja tudi za zeliščna zdravila.

Druga zdravila lahko povečajo ali zmanjšajo učinek zdravila Ropinirol Actavis in obratno. Med takšnimi zdravili so:

- ciprofloksacin (antibiotik),
- enoksacin (antibiotik),
- fluvoksamin (zdravilo za zdravljenje depresije),
- hormonsko nadomestno zdravljenje (HNZ),
- antipsihotiki in druga zdravila, ki onemogočajo delovanje dopamina v možganih (npr. sulpirid ali metoklopramid).

Zdravniku morate povedati, da jemljete zdravilo Ropinirol Actavis, in predpisal vam bo drugo zdravilo.

Zdravilo Ropinirol Actavis skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

Če vzamete zdravilo Ropinirol Actavis s hrano, je manj verjetno, da vam bo slabo ali da boste bruhal. O uživanju alkohola med uporabo ropinirola ni podatkov, zato med zdravljenjem z ropinirolom ne pijte alkoholnih pijač.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Uporaba zdravila Ropinirol Actavis ni priporočljiva, če ste noseči, razen če zdravnik presodi, da so koristi jemanja tega zdravila za vas večje od tveganja za vašega nerojenega otroka.

Uporaba zdravila Ropinirol Actavis ni priporočljiva, če dojite, ker lahko zdravilo vpliva na nastajanje mleka.

Zdravniku morate takoj povedati, če ste noseči, domnevate, da ste noseči, ali nameravate zanositi. Zdravnik vam bo tudi svetoval, če dojite ali nameravate dojiti. Morda vam bo svetoval, da prenehate z jemanjem zdravila Ropinirol Actavis.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Ropinirol Actavis lahko vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, ker lahko povzroči omotico ali vrtoglavico.

Povzroči lahko tudi izredno zaspanost (somnolenco) in obdobja spanja, ki se začnejo povsem nenadoma. Če imate takšne učinke, ne smete voziti ali se izpostavljati okoliščinam, v katerih bi zaspanost ali nenadno spanje povzročila nevarnost za resno poškodbo ali smrt (npr. med uporabo strojev), dokler takšna obdobja ne minejo.

Zdravilo Ropinirol Actavis vsebuje laktozo

Zdravilo Ropinirol Actavis vsebuje mlečni sladkor (laktozo). Če vam je zdravnik povedal, da slabo prenašate nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Ropinirol Actavis

Pri jemanju zdravila Ropinirol Actavis natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo Ropinirol Actavis uporabljamo različno glede na bolezen.

Za odmerke, ki jih ni mogoče/ni praktično doseči s to jakostjo zdravila, so na voljo druge jakosti.

Parkinsonova bolezen

Začetni odmerek je 0,25 mg ropinirola trikrat na dan en teden. Nato je treba odmerek postopoma povečevati takole:

1. teden: 0,25 mg ropinirola 3-krat na dan.
2. teden: 0,5 mg ropinirola 3-krat na dan.
3. teden: 0,75 mg ropinirola 3-krat na dan.
4. teden: 1 mg ropinirola 3-krat na dan.

Potem lahko zdravnik odmerek poveča ali zmanjša, da doseže najboljši učinek.

Običajni odmerek je med 1 in 3 mg ropinirola trikrat na dan (celoten dnevni odmerek od 3 do 9 mg). Če pa takšen odmerek ne doseže ali ne ohrani zadostnega učinka, je mogoče celotni dnevni odmerek postopoma povečati do 24 mg.

Zdravilo Ropinirol Actavis je mogoče uporabljati tudi skupaj z drugimi zdravili proti Parkinsonovi bolezni. Če uporabljate druga zdravila proti Parkinsonovi bolezni, vam bo zdravnik med jemanjem zdravila Ropinirol Actavis morda zmanjšal njihov odmerek.

Sindrom nemirnih nog

Zdravilo Ropinirol Actavis vzemite enkrat na dan, vsak dan ob približno istem času. Praviloma ga je treba jemati tik pred spanjem, vendar ga lahko vzamete do 3 ure prej, preden ležete. Natančni odmerek zdravila Ropinirol Actavis se lahko od bolnika do bolnika razlikuje. Zdravnik bo določil odmerek, ki ga morate jemati vsak dan, in njegova navodila morate upoštevati. Ko boste začeli jemati zdravilo Ropinirol Actavis, vam bo zdravnik odmerek postopoma povečeval.

Začetni odmerek ropinirola je 0,25 mg enkrat na dan. Po dveh dneh bo zdravnik odmerek verjetno povečal na 0,5 mg ropinirola enkrat na dan za preostanek prvega tedna zdravljenja. Nato vam lahko odmerek

povečuje za 0,5 mg na teden v teku treh tednov, do odmerka 2 mg ropinirola na dan. Pri nekaterih bolnikih, ki se jim stanje ne izboljša dovolj, je mogoče odmerek postopoma povečevati do največ 4 mg na dan.

Po treh mesecih zdravljenja z zdravilom Ropinirol Actavis vam lahko zdravnik odmerek prilagodi ali zdravljenje konča, odvisno od vaših simptomov in počutja.

Način uporabe

Tableto/tablete zdravila Ropinirol Actavis zaužijte cele z vodo. Tablete/tablet ne smete zgristi. Zdravilo Ropinirol Actavis lahko vzamete s hrano ali brez nje. Jemanje zdravila Ropinirol Actavis s hrano lahko zmanjša verjetnost za pojav slabosti (navzee), ki je možen neželeni učinek zdravila Ropinirol Actavis.

Otroci in mladostniki

Zdravilo Ropinirol Actavis ni priporočljivo za otroke in mladostnike, mlajše od 18 let.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Ropinirol Actavis, kot bi smeli

V primeru zaužitja prevelikega odmerka zdravila se lahko pojavijo: slabost v želodcu ali bruhanje, omotica (ali vrtoglavica), zaspanost, utrujenost (duševna ali telesna), bolečine v trebuhu, omedlevica ali živčnost. Če vzamete več zdravila Ropinirol Actavis, kot bi smeli, ali če vaše zdravilo vzame kdo drug, to takoj povejte zdravniku ali farmacevtu. Pokažite mu pakiranje zdravila.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Ropinirol Actavis

Če ste pozabili vzeti odmerek zdravila Ropinirol Actavis, ne vzemite dodatnega odmerka, da bi nadomestili pozabljenega. Naslednji odmerek zdravila Ropinirol Actavis vzemite ob običajnem času.

Parkinsonova bolezen: Če ste pozabili vzeti zdravilo Ropinirol Actavis en dan ali več, se morate glede ponovnega začetka jemanja posvetovati z zdravnikom.

Sindrom nemirnih nog: Če ste pozabili vzeti zdravilo Ropinirol Actavis za več kot nekaj dni, se morate glede ponovnega začetka jemanja posvetovati z zdravnikom.

Če ste prenehali jemati zdravilo Ropinirol Actavis

Zdravilo morate jemati še naprej, tudi če se ne počutite bolje, kajti traja lahko več tednov, preden začne zdravilo delovati. Če menite, da je učinek zdravila Ropinirol Actavis premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ne vzemite več tablet, kot vam je naročil zdravnik.

Če želite nehati jemati zdravilo, mora biti opuščanje postopno. Zdravila Ropinirol Actavis ne smete nehati jemati, ne da bi se posvetovali z zdravnikom. Če se vam simptomi po prenehanju zdravljenja z zdravilom Ropinirol Actavis poslabšajo, se morate posvetovati z zdravnikom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Ropinirol Actavis neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Zdravniku morate povedati, če opazite kakšen neželen učinek in vas ta skrbi. Pogostejši neželeni učinki zdravila Ropinirol Actavis se lahko pojavijo na začetku zdravljenja in/ali po povečanju odmerka.

Parkinsonova bolezen

Med uporabo zdravila Ropinirol Actavis za zdravljenje Parkinsonove bolezni so bili opisani naslednji neželeni učinki:

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- občutek slabosti
- omedlevica
- občutek zaspanosti
- motnje gibanja (diskinezija (med uporabo skupaj z zdravilom levodopo))

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- bruhanje
- omotica (ali vrtoglavica)
- halucinacije
- bolečine v trebuhu
- zgaga
- otekanje nog
- občutek zmedenosti (med uporabo hkrati z levodopo)

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- Znižanje krvnega tlaka, ki lahko povzroči omotico ali omedlevico, zlasti ko vstanete iz sedečega ali ležečega položaja.
- Zdravilo Ropinirol Actavis lahko povzroči čezmerno zaspanost čez dan in obdobja spanja, ki se začnejo povsem nenadoma, ne da bi bolnik pred tem občutil zaspanost.
- druge duševne reakcije, razen halucinacij, npr. delirij, blodnje ali nerazumno sumničavost (paranojo)

Neznana pogostnost (pogostosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

Spremenjeno delovanje jeter (nenormalni izvidi preiskav krvi).

Alergijske reakcije, kot so koprivnica, otekanje obraza in ust, kožni izpuščaj in srbenje.

Lahko opazite naslednje neželene učinke:

- nezmožnost upreti se impulzu, težnji ali skušnjavi po dejanjih, ki bi lahko škodila vam ali drugim, kot so:
 - močna želja po čezmernem hazardiranju ne glede na posledice za vas ali za družino, spremenjeno ali povečano spolno zanimanje in vedenje, ki vam ali drugim povzroča znatno zaskrbljenost, na primer povečan libido,
 - čezmerno nakupovanje ali trošenje denarja, ki ju ne morete nadzorovati,
 - prenajedanje (uživanje velikih količin hrane v kratkem obdobju) ali kompulzivno uživanje hrane (uživanje večje količine hrane od normalnih in več, kot je potrebno za potešitev lakote).

Obvestite svojega zdravnika, če opazite katero od navedenih vedenjskih sprememb; z vami se bo pogovoril o načinih obvladovanja ali zmanjšanja simptomov.

Sindrom nemirnih nog

Med uporabo zdravila Ropinirol Actavis za zdravljenje sindroma nemirnih nog so bili opisani naslednji neželeni učinki:

Zelo pogosti (pojavi se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- občutek slabosti

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- omotica (ali vrtoglavica)
- občutek zaspanosti
- utrujenost (duševna ali telesna)
- bolečine v trebuhu
- omedlevica
- živčnost

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

Zmedenost, halucinacije. Znižanje krvnega tlaka vam lahko povzroči omotico ali omedlevico, zlasti ko vstanete iz sedečega ali ležečega položaja.

Med zdravljenjem z zdravilom Ropinirol Actavis se vam lahko pojavi nenavadno poslabšanje simptomov (simptomi se npr. stopnjujejo, se začnejo bolj zgodaj v teku dneva ali hitreje med počitkom, ali prizadenejo druge dele telesa, npr. roke). Če se vam to zgodi, se morate posvetovati z zdravnikom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, čim prej obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za zastrupitve, Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Faks: + 386 (0)1 434 76 46, e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Ropinirol Actavis

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Ropinirol Actavis ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na {vsebniku za tablete ali} pretisnem omotu in na škatli. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Ropinirol Actavis

- Zdravilna učinkovina je ropinirol. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg ali 5 mg ropinirola (v obliki klorida).
- Pomožne snovi so laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, predgelirani koruzni škrob, magnezijev stearat, polivinilalkohol, titanov dioksid (E171), makrogol 3350 in smukec. Poleg tega vsebujejo 0,5-mg tablete še rumeni železov oksid (E172), 1-mg tablete rumeni železov oksid (E172), modro FCF (E133) in črni železov oksid (E172), 2-mg tablete rumeni železov oksid (E172) in rdeči železov oksid (E172), 3-mg tablete karmin (E120) in indigotin (E132), 4-mg tablete rumeni železov oksid (E172), rdeči železov oksid (E172) in črni železov oksid (E172) in 5-mg tablete vsebujejo indigotin (E132).

Izgled zdravila Ropinirol Actavis in vsebina pakiranja

Filmsko obložena tableta.

Ropinirol Actavis 0,25 mg filmsko obložena tableta je okrogla bela bikonveksna tableta (s premerom 7 mm), ki ima na eni strani vtisnjeno oznako R0.25.

Ropinirol Actavis 0,5 mg filmsko obložena tableta je okrogla rumena bikonveksna tableta (s premerom 7 mm), ki ima na eni strani vtisnjeno oznako R0.5.

Ropinirol Actavis 1 mg filmsko obložena tableta je okrogla zelena bikonveksna tableta (s premerom 7 mm), ki ima na eni strani vtisnjeno oznako R1.

Ropinirol Actavis 2 mg filmsko obložena tableta je okrogla rožnata bikonveksna tableta (s premerom 7 mm), ki ima na eni strani vtisnjeno oznako R2.

Ropinirol Actavis 3 mg filmsko obložena tableta je okrogla škrlatna bikonveksna tableta (s premerom 8,5 mm), ki ima na eni strani vtisnjeno oznako R3.

Ropinirol Actavis 4 mg filmsko obložena tableta je okrogla oranžna bikonveksna tableta (s premerom 9,5 mm), ki ima na eni strani vtisnjeno oznako R4.

Ropinirol Actavis 5 mg filmsko obložena tableta je okrogla modra bikonveksna tableta (s premerom 10,5 mm), ki ima na eni strani vtisnjeno oznako R5.

Tablete so pakirane v pretisnih omotih ali vsebnikih za tablete (iz HDPE), ki imajo za otroke varno navojno zaporko.

Velikosti pakiranj:

0,25 mg filmsko obložene tablete:

Pretisni omot: 2, 12, 20, 21, 30, 50, 60, 84, 100, 126 in 210 filmsko obloženih tablet

Vsebnik za tablete: 84 in 100 filmsko obloženih tablet

0,5 mg filmsko obložene tablete:

Pretisni omot: 20, 21, 28, 30, 50, 60, 84 in 100 filmsko obloženih tablet

Vsebnik za tablete: 84 in 100 filmsko obloženih tablet

1 mg filmsko obložene tablete:

Pretisni omot: 20, 21, 28, 30, 50, 60, 84 in 100 filmsko obloženih tablet

Vsebnik za tablete: 84 in 100 filmsko obloženih tablet

2 mg filmsko obložene tablete:

Pretisni omot: 20, 21, 28, 30, 50, 60, 84 in 100 filmsko obloženih tablet

Vsebnik za tablete: 84 in 100 filmsko obloženih tablet

3 mg filmsko obložene tablete:

Pretisni omot: 20, 21, 30, 50, 60, 84 in 100 filmsko obloženih tablet

Vsebnik za tablete: 84 in 100 filmsko obloženih tablet

4 mg filmsko obložene tablete:

Pretisni omot: 20, 21, 30, 50, 60, 84 in 100 filmsko obloženih tablet

Vsebnik za tablete: 84 in 100 filmsko obloženih tablet

5 mg filmsko obložene tablete:

Pretisni omot: 20, 21, 30, 50, 60, 84 in 100 filmsko obloženih tablet

Vsebnik za tablete: 84 in 100 filmsko obloženih tablet

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandija

Izdelovalec

Actavis Ltd.

B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08

Malta

in

BIOVENA Pharma Sp. z o.o.

ul. Odrowąża 13,

03-310 Warszawa

Poljska

To zdravilo je odobreno v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Danska	Ropact
Češka	Ropinirol Actavis 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 mg potahované tablety
Estonija	Ropinirole Actavis
Madžarska	Ropinirol Actavis
Islandija	Ropinirol Actavis
Latvija	Ropinirole Actavis
Litva	Ropinirole Actavis
Malta	Ropinir
Poljska	Ropinir
Romunija	Ropinirol Actavis 0.25 mg, 0,5mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg comprimate filmate
Slovenija	Ropinirol Actavis 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg filmsko obložene tablete
Slovaška	Ropinirol Actavis 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg

Navodilo je bilo odobreno 09.10.2013