

NAVODILO ZA UPORABO

Cynt[®] 0,2 mg filmsko obložene tablete

Cynt[®] 0,3 mg filmsko obložene tablete

Cynt[®] 0,4 mg filmsko obložene tablete
moksonidin

Pred uporabo natančno preberite to navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Cynt in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Cynt
3. Kako jemati zdravilo Cynt
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Cynt
6. Dodatne informacije

1 KAJ JE ZDRAVILO CYNT IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Cynt vsebuje zdravilno učinkovino moksonidin.

Zdravilo Cynt spada v skupino zdravil, ki se imenujejo antihipertenzivi.

Zdravilo Cynt se uporablja za zdravljenje visokega krvnega tlaka (hipertenzije). Deluje v osrednjem živčevju tako, da sprošča in širi vaše žile. To pomaga znižati krvni tlak.

2 KAJ MORATE VEDETI PREDEN VZAMETE ZDRAVILO CYNT

Ne jemljite zdravila Cynt:

- če ste alergični (preobčutljivi) na moksonidin ali katerikoli sestavino zdravila Cynt (navedeno v poglavju 6),
- če imate počasen srčni utrip (pod 50 utripov na minuto) zaradi težav s srcem kot so "bolezen sinusnega vozla" ali atrioventrikularnega bloka druge ali tretje stopnje,
- če imate srčno popuščanje.

Ne jemljite zdravila Cynt, če se karkoli od zgoraj navedenega nanaša na vas. Če niste gotovi, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom, preden začnete jemati zdravilo Cynt.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Cynt:

Posvetujte se s svojim zdravnikom ali s farmacevtom preden vzamete vaše zdravilo, če:

- če imate težave s srcem, kot je atrioventrikularni blok prve stopnje,
- če imate hudo bolezen koronarnih arterij ali nestabilno bolečino v srcu (angina pectoris),
- če imate težave z ledvicami. Morda vam bo moral zdravnik zmanjšati odmerk.

Če se karkoli od zgoraj navedenega nanaša na vas (ali niste gotovi), se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete zdravilo Cynt.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Povejte svojemu zdravniku ali farmacevtu, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- druga zdravila za zniževanje krvnega tlaka. Zdravilo Cynt lahko poveča učinek teh zdravil.
- zdravila za zdravljenje depresije, kot sta imipramin ali amitriptilin,
- zdravila za zdravljenje tesnobe, pomirjevala in uspavalne tablete, kot so benzodiazepini
- antagonist adrenergičnih receptorjev beta – zdravila za zdravljenje povišanega krvnega tlaka (glejte poglavje 3 - Če ste prenehali jemati zdravilo Cynt),
- zdravilo Cynt se izloča iz vašega telesa preko ledvic v procesu, imenovanem "tubularno izločanje". Druga zdravila, ki se izločajo preko ledvic na enak način, lahko vplivajo na način delovanja zdravila Cynt.

Če se karkoli od zgoraj navedenega nanaša na vas (ali niste gotovi), se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete zdravilo Cynt.

Jemanje zdravila Cynt skupaj s hrano in pijačo

- Zdravilo lahko vzamete s hrano ali brez nje.
- Med jemanjem zdravila Cynt ne pijte alkohola, ker zdravilo Cynt lahko poveča njegov učinek.

Nosečnost in dojenje

- Povejte svojemu zdravniku, če ste noseči ali bi lahko bili noseči. Običajno vam bo zdravnik svetoval, da prenehajte z uporabo zdravila Cynt in vam namesto tega predpisal drugo zdravilo.
- Povejte svojemu zdravniku, če dojite ali nameravate začeti dojit. Zdravilo Cynt ni primerno za doječe matere. Zdravnik vam bo morda predpisal drugo zdravilo, če želite dojit, ali vas bo prosil, da prenehajte z dojenjem.

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Morda boste med jemanjem zdravila Cynt zaspani in omotični. Če je tako, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom, preden boste upravljali vozila ali stroje.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Cynt

Zdravilo Cynt vsebuje laktozo monohidrat. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3 KAKO JEMATI ZDRAVILO CYNT

Pri jemanju zdravila Cynt natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odmerkov ne smete spreminjati ali zdravljenja prekinjati, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.

Zdravljenje začnite z najnižjim dnevnim odmerkom, t.j. eno 0,2 mg tableto zdravila Cynt zjutraj. Če rezultati zdravljenja po treh tednih niso zadovoljivi, lahko odmerek povečate na 0,4 mg moksonidina, ki ga lahko vzamete bodisi naenkrat, ali pa ga razporedite na več manjših odmerkov čez dan (ena 0,2 mg tableta zdravila Cynt zjutraj in ena zvečer).

Skupni dnevni odmerek v nobenem primeru ne sme preseči 0,4 mg v enem odmerku ali 0,6 mg v večjih odmerkih čez dan.

Zdravilo lahko jemljete s hrano ali brez, z nekaj tekočine.

Če imate zmerno do hudo ledvično okvaro, je začetni odmerek 0,2 mg na dan. Če je treba in če zdravilo dobro prenašate, se lahko dnevni odmerek poveča na 0,4 mg. Če ste na hemodializi, je začetni odmerek 0,2 mg na dan. Če je treba in če zdravilo dobro prenašate, se lahko dnevni odmerek poveča na 0,4 mg.

Moksonidina naj ne uporabljajo otroci in mladostniki, mlajši od 18 let, ker ni podatkov o varnosti in učinkovitosti.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Cynt, kot bi smeli

Svetujemo vam, da shranite škatlo, da bo zdravnik lahko takoj uvedel potrebno zdravljenje.

Znaki in simptomi, ki kažejo na preveliko odmerjanje so: glavobol, pomiritev (sedacija), zaspanost, nizek krvni tlak (hipotenzija), omotičnost, splošna oslabeledost, počasen srčni utrip (bradikardija), suha usta, bruhanje, utrujenost in bolečine v zgornjem delu trebuha.

Po izsledkih nekaj študij z velikimi odmerki pri živalih se lahko poleg tega pojavijo prehodna hipertenzija, tahikardija in hiperglikemija.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Cynt

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali jemati zdravilo Cynt

Ne prekinjajte zdravljenja brez posveta z vašim zdravnikom! Trajanje zdravljenja bo določil zdravnik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4 MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Cynt neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Naslednji neželeni učinki se lahko pojavijo pri tem zdravilu.

Med jemanjem zdravila Cynt so najpogostejše opisani neželeni učinki suhost ust, omotica, šibkost in zaspanost. Ti simptomi se po prvih tednih zdravljenja pogosto zmanjšajo.

Prenehajte jemati zdravilo Cynt in nemudoma obiščite zdravnika, če opazite katerega o naslednjih resnih neželenih učinkov – morda potrebujete nujno medicinsko pomoč:

- Otekanje obraza, ustnic ali ust (angioedem). To se pojavi občasno, prizadene manj kot 1 od 100 bolnikov.

Drugi neželeni učinki vključujejo:

Zelo pogosti (pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- suha usta

Pogosti (pojavijo se pri manj kot 1 od 10 bolnikov):

- bolečina v hrbtu
- glavobol
- šibkost (astenija)
- vrtoglavica (vertigo)
- omotica
- kožni izpuščaj ali srbenje (pruritus)
- nespečnost (insomnia), zaspanost
- slabost, driska, bruhanje, slaba prebava

Občasni (pojavijo se pri manj kot 1 od 100 bolnikov):

- bolečina v vratu
- nervoznost
- omedlevica (sinkopa)
- otekanje (edem)
- zvonjenje ali šumenje v ušesih (tinitus)
- počasen srčni utrip (bradikardija)
- nizek krvni pritisk, vključno s padcem krvnega pritiska ob vstajanju

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta!

5 SHRANJEVANJE IN ROK UPORABNOSTI

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Cynt 0,2 mg filmsko obložene tablete shranjujte pri temperaturi do 25 °C!

Cynt 0,3 mg filmsko obložene tablete in Cynt 0,4 mg filmsko obložene tablete shranjujte pri temperaturi do 30 °C!

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli.

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6 DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Cynt

Zdravilna učinkovina je: moksonidin.

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 0,2 ali 0,3 ali 0,4 mg moksonidina.

Pomožne snovi so: laktoza monohidrat, povidon, krospovidon, magnezijev stearat, hipromeloza, etilceluloza, makrogol, smukec, rdeči železov oksid (E172) in titanov dioksid (E171).

Izgled zdravila Cynt in vsebina pakiranja

Cynt® 0,2 mg filmsko obložene tablete: okrogle, blede rožnate filmsko obložene tablete, z odtisom 0,2.

Cynt® 0,3 mg filmsko obložene tablete: okrogle, rožnate filmsko obložene tablete, z odtisom 0,3.

Cynt® 0,4 mg filmsko obložene tablete: okrogle, rdeče filmsko obložene tablete, z odtisom 0,4.

Škatla s tremi pretisnimi omoti po 10 filmsko obloženih tablet ali enim pretisnim omotom po 30 filmsko obloženih tablet.

Način izdaje zdravila Cynt

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Abbott Laboratories GmbH, Freundallee 9a, 30173 Hannover, Nemčija

Izdelovalec

Abbott Healthcare S.A.S.

Route de Belleville Lieu-dit "Maillard", 01400 Chatillon sur Chalaronne, Francija

Navodilo je bilo odobreno

13.05.2013