

1.3.1	Losartan
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Navodilo za uporabo

Losartan Krka 25 mg filmsko obložene tablete
Losartan Krka 50 mg filmsko obložene tablete
Losartan Krka 100 mg filmsko obložene tablete
kalijev losartanat

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Losartan Krka in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Losartan Krka
3. Kako jemati zdravilo Losartan Krka
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Losartan Krka
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Losartan Krka in za kaj ga uporabljamo

Losartan spada v skupino zdravil, ki jih imenujemo antagonisti receptorjev angiotenzina II. Angiotenzin II je snov, ki nastaja v telesu. Veže se na receptorje v krvnih žilah in tako povzroči, da se zožijo. Na ta način se krvni tlak zviša. Losartan preprečuje vezavo angiotenzina II na te receptorje in tako povzroči, da se žile sprostijo, krvni tlak pa zniža. Losartan upočasni pešanje delovanja ledvic pri bolnikih z visokim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo tipa 2.

Zdravilo Losartan Krka se uporablja:

- za zdravljenje visokega krvnega tlaka (hipertenzije) pri odraslih ter otrocih in mladostnikih, starih od 6 do 18 let;
- za zaščito ledvic pri bolnikih s hipertenzijo in sladkorno boleznijo tipa 2, pri katerih so laboratorijski izvidi pokazali ledvično okvaro in proteinurijo $\geq 0,5$ g na dan (stanje s preveliko količino beljakovin v urinu);
- za zdravljenje bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem, če zdravnik meni, da zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze (zaviralci ACE, zdravila za zniževanje krvnega tlaka) ni primerno; če je srčno popuščanje ob zdravljenju z zaviralcem ACE stabilno, vam zdravnik zdravila ne sme zamenjati z losartanom;
- pri bolnikih z visokim krvnim tlakom in zadebeljenim levim prekatom, saj zdravilo Losartan Krka zmanjša tveganje za možgansko kap (indikacija iz študije LIFE).

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Losartan Krka

Ne jemljite zdravila Losartan Krka

- če ste alergični na kalijev losartanat ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če imate hudo okvaro jeter,

1.3.1	Losartan
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

- če ste noseči že več kot tri mesece. (Jemanje zdravila Losartan Krka v zgodnji nosečnosti tudi ni priporočljivo – glejte Nosečnost),
- če imate sladkorno bolezen ali okvarjeno delovanje ledvic in se zdravite z zdravilom za znižanje krvnega tlaka, ki vsebuje aliskiren.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Losartan Krka se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če obstaja možnost, da zanosite). Jemanje zdravila Losartan Krka ni priporočljivo v zgodnjem obdobju nosečnosti, po tretjem mesecu nosečnosti pa ga ne smete jemati, ker lahko vašemu otroku povzroči resno škodo (glejte poglavje o nosečnosti).

Preden vzamete zdravilo Losartan Krka, se posvetujte z zdravnikom:

- če ste kdaj imeli otekanje obraza, ustnic, grla in/ali jezika (angioedem) (glejte tudi poglavje 4 "Možni neželeni učinki");
- če močno bruha ali imate hudo drisko in zato izgublajte veliko tekočine in/ali soli;
- če jemljete zdravila, ki povečajo izločanje vode skozi ledvice (diuretike) ali ste na dieti s hrano z zmanjšano količino soli;
- če veste, da imate zožanje ali zamašitev krvnih žil, ki vodijo do ledvic, ali če so vam pred kratkim presadili ledvico;
- če imate jetrno okvaro (glejte poglavje 2 Ne jemljite zdravila Losartan Krka in poglavje 3 Odmerjanje pri posebnih skupinah bolnikov);
- če imate srčno popuščanje z ledvično okvaro ali brez nje ali sočasne hude, smrtno nevarne motnje srčnega ritma. Posebna previdnost je potrebna, če sočasno jemljete beta zaviralec;
- če imate težave s srčnimi zaklopkami ali srčno mišico;
- če imate zmanjšan krvni obtok v srčnih žilah (koronarno srčno bolezen) ali zmanjšan krvni obtok v možganih (možgansko-žilna bolezen);
- če imate sindrom povezan s povečanim izločanjem hormona aldosterona iz nadledvične žleze zaradi okvare znotraj žleze (primarni hiperaldosteronizem);
- če jemljete druga zdravila, ki lahko zvišajo vrednosti kalija v serumu (glejte poglavje 2 "Druga zdravila in zdravilo Losartan Krka");
- če jemljete katero od naslednjih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka:
 - zaviralec ACE (na primer enalapril, lizinopril ali ramipril), zlasti če imate kakšne težave z ledvicami, ki so povezane s sladkorno boleznijo,
 - aliskiren.

Zdravnik vam bo morda v rednih presledkih kontroliral delovanje ledvic, krvni tlak in količino elektrolitov (npr. kalija) v krvi.

Glejte tudi informacije pod naslovom "Ne jemljite zdravila Losartan Krka".

Otroci in mladostniki

Losartan so preučevali pri otrocih. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom.

Uporabe losartana se ne priporoča pri otrocih, ki imajo težave z ledvicami ali jetri, ker je za te skupine bolnikov na voljo malo podatkov. Uporabe losartana ne priporočamo pri otrocih, mlajših od 6 let, saj njegovo delovanje pri tej starostni skupini ni bilo dokazano.

Druga zdravila in zdravilo Losartan Krka

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Obvestite zdravnika, če jemljete dodatke kalija, nadomestke soli, ki vsebujejo kalij, zdravila, ki varčujejo s kalijem, kot so določeni diuretiki (npr. amilorid, triamteren, spironolakton), ali druga zdravila, ki lahko zvišajo vrednosti kalija v serumu (npr. heparin, izdelki, ki vsebujejo trimetoprim), saj njihova uporaba v kombinaciji z zdravilom Losartan Krka ni priporočljiva.

1.3.1	Losartan
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Še posebej pozorni bodite, če med zdravljenjem z zdravilom Losartan Krka jemljete katero od naslednjih zdravil:

- druga zdravila za zniževanje krvnega tlaka, ker lahko dodatno znižajo vaš krvni tlak. Krvni tlak vam lahko zniža tudi katero od naslednjih zdravil/skupin zdravil: triciklični antidepressivi, antipsihotiki, baklofen, amifostin;
- nesteroidne antirevmatike, kot je indometacin, vključno z zaviralci COX-2 (zdravila, ki zdravijo vnetje in se lahko uporabljajo za odpravljanje bolečine), ker lahko zmanjšajo učinek, ki ga ima losartan na znižanje krvnega tlaka.

Zdravnik vam bo morda moral spremeniti odmerek in/ali upoštevati druge previdnostne ukrepe:

- Če jemljete zaviralec ACE ali aliskiren (glejte tudi informacije pod naslovoma "Ne jemljite zdravila Losartan Krka" in "Opozorila in previdnostni ukrepi").

Če imate ledvično okvaro, lahko sočasna uporaba teh zdravil vodi do dodatnega poslabšanja ledvične funkcije.

Zdravila, ki vsebujejo litij, se v kombinaciji z losartanom brez natančnega zdravnikovega nadzora ne smejo uporabljati.

Zdravilo Losartan Krka skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Losartan Krka lahko vzamete s hrano ali na tešče.

Med jemanjem zdravila Losartan Krka se je treba izogibati uživanju soka grenivke.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če obstaja možnost, da zanosite). Praviloma vam bo svetoval, da zdravilo Losartan Krka prenehate jemati, preden zanosite ali takoj ko izveste, da ste noseči, in vam priporočil jemanje drugega zdravila. Jemanje zdravila Losartan Krka v zgodnjem obdobju nosečnosti ni priporočljivo, po tretjem mesecu nosečnosti pa ga ne smete jemati, ker lahko vašemu otroku povzroči resno škodo.

Dojenje

Zdravniku povejte, če dojite ali če nameravate začeti dojiti. Zdravila Losartan Krka ne priporočajo za doječe matere. Če želite dojiti, bo zdravnik za vas morda izbral drugo zdravljenje, zlasti če je vaš otrok novorojenček ali nedonošenček.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Študij o vplivu na sposobnost za vožnjo in upravljanje strojev niso izvedli. Zelo malo verjetno je, da bi losartan vplival na te sposobnosti, lahko pa tako kot veliko drugih zdravil za zdravljenje visokega krvnega tlaka pri nekaterih bolnikih povzroči omotico ali zaspanost. Če ste omotični ali zaspani, se posvetujte z zdravnikom, preden se lotite teh aktivnosti.

Zdravilo Losartan Krka vsebuje laktozo

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

1.3.1	Losartan
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

3. Kako jemati zdravilo Losartan Krka

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zdravnik vam bo predpisal ustrezen odmerek zdravila Losartan Krka glede na vaše stanje in glede na to, ali jemljete še katera druga zdravila. Pomembno je, da zdravilo Losartan Krka jemljete tako dolgo, kot vam je predpisal zdravnik. Tako vzdržujete enakomeren nadzor krvnega tlaka.

Zdravilo Losartan Krka je na voljo v naslednjih jakostih: 25 mg, 50 mg in 100 mg. Losartan Krka 25 mg filmsko obložene tablete se lahko delijo na enake odmerke.

Odrasli bolniki z visokim krvnim tlakom

Zdravljenje se običajno začne s 50 mg losartana (ena tableta zdravila Losartan Krka 50 mg) enkrat na dan. Največji učinek zmanjšanja krvnega tlaka naj bi bil dosežen 3 do 6 tednov po začetku zdravljenja. Pri nekaterih bolnikih se odmerek kasneje lahko poveča na 100 mg losartana (dve tableti zdravila Losartan Krka 50 mg) enkrat na dan.

Če imate občutek, da je učinek losartana premočan ali prešibek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Otroci, stari manj kot 6 let

Uporabe zdravila Losartan Krka ne priporočamo pri otrocih, mlajših od 6 let, saj njegovo delovanje pri tej starostni skupini ni bilo dokazano.

Otroci in mladostniki (starih 6 – 18 let)

Priporočeni začetni odmerek pri bolnikih, ki tehtajo med 20 in 50 kg, je 0,7 mg losartana na kg telesne teže enkrat na dan (do 25 mg zdravila Losartan Krka). Zdravnik lahko odmerek poveča, če tlak ni pod nadzorom.

Druge oblike tega zdravila so lahko bolj primerne za otroke; vprašajte zdravnika ali farmacevta.

Odrasli bolniki z visokim krvnim tlakom in s sladkorno boleznijo tipa 2

Zdravljenje se običajno začne s 50 mg losartana (ena tableta zdravila Losartan Krka 50 mg) enkrat na dan. Odmerek se kasneje lahko poveča na 100 mg losartana (dve tableti zdravila Losartan Krka 50 mg) enkrat na dan, glede na odziv krvnega tlaka.

Zdravilo Losartan Krka lahko jemljete skupaj z drugimi zdravili za zniževanje krvnega tlaka (npr. diuretiki, zaviralci kalcijevih kanalčkov, alfa ali beta zaviralci in zdravili, ki delujejo na osrednje živčevje) kot tudi z inzulinom in drugimi običajno uporabljenimi zdravili za zmanjševanje količine glukoze v krvi (npr. sulfonilsečnino, glitazoni, zaviralci glukozidaze).

Odrasli bolniki s srčnim popuščanjem

Zdravljenje se običajno začne z 12,5 mg losartana (pol tablete zdravila Losartan Krka 25 mg) enkrat na dan. Večinoma je treba odmerek povečati postopoma, tedensko (tj. 12,5 mg na dan prvi teden, 25 mg na dan drugi teden, 50 mg na dan tretji teden, 100 mg na dan četrti teden, 150 mg na dan peti teden) do vzdrževalnega odmerka, ki ga določi vaš zdravnik. Lahko boste dobili največji odmerek, in sicer 150 mg losartana (na primer tri tablete zdravila Losartan Krka 50 mg ali eno tableto zdravila Losartan Krka 100 mg in eno tableto Losartan Krka 50 mg) enkrat na dan.

Pri zdravljenju srčnega popuščanja se losartan običajno kombinira z diuretikom (zdravilo, ki poveča količino vode, ki se izloči skozi ledvice) in/ali digitalisom (zdravilo, ki pripomore, da je srce močnejše in učinkovitejše) in/ali beta zaviralcem.

Odmerjanje pri posebnih skupinah bolnikov

Zdravnik lahko predpiše manjši odmerek predvsem na začetku zdravljenja določenih bolnikov, npr.

PI_Text075699_1	- Updated:	Page 4 of 8
-----------------	------------	-------------

1.3.1	Losartan
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

bolnikov, ki se zdravijo z velikimi odmerki diuretikov, bolnikov z jetrno okvaro ali bolnikov, starejših od 75 let.

Losartana ne priporočamo za bolnike s hudo jetrno okvaro (glejte poglavje »Ne jemljite zdravila Losartan Krka«).

Jemanje zdravila

Tablete morate pogoltniti cele s kozarcem vode. Dnevni odmerek poskusite vzeti vsak dan približno ob istem času. Pomembno je, da z jemanjem zdravila Losartan Krka nadaljujete, dokler vam zdravnik ne naroči drugače.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Losartan Krka, kot bi smeli

Če slučajno vzamete preveč tablet, se takoj posvetujte z zdravnikom. Simptomi prevelikega odmerjanja so nizek krvni tlak, pospešen srčni utrip, mogoče upočasnen srčni utrip.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Losartan Krka

Če ste slučajno pozabili vzeti dnevni odmerek, vzemite naslednjega kot običajno. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zdravilo Losartan Krka takoj prenehajte jemati in se posvetujte z zdravnikom ali pa takoj pojdite na urgenco, če se pri vas pojavi kaj od naslednjega: huda alergijska reakcija (izpuščaj, srbenje, otekanje obraza, ustnic, v ustih ali žrelu, ki lahko oteži požiranje ali dihanje).

To je resen, a redek neželeni učinek, ki se pojavi pri več kot 1 od 10.000 bolnikov, vendar manj kot 1 od 1.000 bolnikov. Morda boste potrebovali nujno zdravniško pomoč ali zdravljenje v bolnišnici.

Poročali so o naslednjih neželenih učinkih losaratana:

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- omotica,
- nizek krvni tlak (posebno po veliki izgubi vode iz krvnih žil, npr. pri bolnikih s hudim srčnim popuščanjem ali pri bolnikih, zdravljenih z velikimi odmerki zdravil za izločanje seča),
- od odmerka odvisni ortostatski učinki, kot je padec krvnega tlaka, ko vstanete iz ležečega ali sedečega položaja
- slabotnost,
- utrujenost,
- premalo sladkorja v krvi (hipoglikemija),
- preveč kalija v krvi (hiperkaliemija).
- spremembe v delovanju ledvic, vključno z ledvično odpovedjo,
- zmanjšano število rdečih krvnih celic (anemija),
- zvišane vrednosti sečnine v krvi, kreatinina v serumu in kalija v serumu pri bolnikih s srčnim popuščanjem.

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- zaspanost,
- glavobol,
- motnje spanja,

1.3.1	Losartan
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

- občutek pospešenega bitja srca (palpitacije),
- huda bolečina v prsnem košu (angina pectoris),
- oteženo dihanje (dispneja),
- bolečina v trebuhu,
- zaprtje,
- driska,
- občutek siljenja na bruhanje (navzea),
- bruhanje,
- koprivnica (urtikarija),
- srbenje (pruritus),
- izpuščaj,
- lokalizirano otekanje (edem),
- kašelj.

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- preobčutljivost,
- angioedem,
- vnetje krvnih žil (vaskulitis), vključno s pikčastimi krvavitvami na spodnjih udih (Henoch-Schönleinovo purpuro),
- odrevenelost ali mravljinčenje (parestezija),
- omedlevica (sinkopa),
- zelo hitro in neredno bitje srca (atrijska fibrilacija),
- možganska kap,
- vnetje jeter (hepatitis),
- zvečana količina alaninaminotransferaze (ALT) v krvi, ki se po prekinitvi zdravljenja običajno popravi.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- znižana koncentracija krvnih ploščic (trombocitopenija),
- migrena,
- nenormalno delovanje jeter,
- bolečine v mišicah in sklepih,
- gripi podobni simptomi,
- bolečine v hrbtu in okužbe sečil (urinarnega trakta),
- občutljivost kože za sončno svetlobo (fotosenzitivnost),
- nepojasnjena bolečina v mišicah, skupaj s temnim urinom (rabdomioliza),
- impotenca,
- vnetje trebušne slinavke (pankreatitis),
- nenormalno znižana koncentracija natrija v krvni plazmi (hiponatriemija),
- potrtoost (depresija),
- splošno slabo počutje,
- zvenenje, brenčanje ali šumenje v ušesih (tinitus),
- motnje okušanja (disgevizija).

Neželeni učinki pri otrocih so podobni kot pri odraslih.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco

1.3.1	Losartan
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Losartan Krka

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Pretisni omot shranjujte v zunanji ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Losartan Krka

- Učinkovina je kalijev losartanat.
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 25 mg kalijevega losartanata, kar ustreza 22,9 mg losartana.
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 50 mg kalijevega losartanata, kar ustreza 45,8 mg losartana.
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg kalijevega losartanata, kar ustreza 91,5 mg losartana.
- Druge sestavine zdravila Losartan Krka 25 mg filmsko obloženih tablet so: uprašena celuloza, laktoza monohidrat, predgelirani koruzni škrob, koruzni škrob, mikrokristalna celuloza, brezvodni koloidni silicijev dioksid (E551) in magnezijev stearat (E470b) v jedru tablete ter hipromeloza 6 cP (E464), smukec, propilenglikol, kinolinsko rumeno (E104) in titanov dioksid (E171) v filmski oblogi.
- Druge sestavine zdravila Losartan Krka 50 mg filmsko obloženih tablet in Losartan Krka 100 mg filmsko obloženih tablet so: uprašena celuloza, laktoza monohidrat, predgelirani koruzni škrob, koruzni škrob, mikrokristalna celuloza, brezvodni koloidni silicijev dioksid (E551) in magnezijev stearat (E470b) v jedru tablete ter hipromeloza 6 cP (E464), smukec, propilenglikol in titanov dioksid (E171) v filmski oblogi.

Glejte poglavje 2 "Zdravilo Losartan Krka vsebuje laktozo".

Izgled zdravila Losartan Krka in vsebina pakiranja

Losartan Krka 25 mg filmsko obložene tablete: rumene, ovalne (dimenzije: 8,5 mm x 4,5 mm), rahlo izbočene tablete z razdelilno zarezo.

Losartan Krka 50 mg filmsko obložene tablete: bele, okrogle (premer: 7,9 – 8,2 mm), rahlo izbočene tablete s posnetimi robovi in z zarezo. Zareza ni namenjena delitvi tablete.

Losartan Krka 100 mg filmsko obložene tablete: bele, ovalne (dimenzije: 15 mm x 8 mm), rahlo izbočene tablete.

1.3.1	Losartan
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Losartan Krka 25 mg filmsko obložene tablete so na voljo v škatlah po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 ali 100 tablet v pretisnih omotih po 7, 10, 14 ali 15 tablet.

Losartan Krka 50 mg filmsko obložene tablete so na voljo v škatlah po 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 ali 100 tablet v pretisnih omotih po 7, 10, 14 ali 15 tablet.

Losartan Krka 100 mg filmsko obložene tablete so na voljo v škatlah po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 ali 100 tablet v pretisnih omotih po 7, 10, 14 ali 15 tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Losartan Krka

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvajalec

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Češka, Madžarska, Irska, Poljska, Slovenija, Slovaška	Losartan Krka
Nemčija	Losartan-Kalium 123 Acurae Pharma
Nizozemska	Losartan kalium HCS

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 6. 2024.