

NAVODILO ZA UPORABO

Kvetiapin Lambda Therapeutic 200 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
Kvetiapin Lambda Therapeutic 300 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
Kvetiapin Lambda Therapeutic 400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
kvetiapin

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberete navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek se posvetujte s svojim zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic
3. Kako jemati zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic vsebuje učinkovino, imenovano kvetiapin. Zdravilo spada v skupino zdravil, ki jih imenujemo antipsihotiki. Zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic se uporablja za zdravljenje številnih bolezni, kot so:

- Shizofrenija: lahko slišite ali čutite stvari, ki jih ni, verjamete stvari, ki niso resnične ali ste neobičajno sumničavi, nezaupljivi, zmedeni, se čutite krive, ste napeti ali potrti.
- Manija: lahko se počutite zelo vznemirjeno, vzhičeno, tesnobno, vznemirjeno ali hiperaktivno ali okoliščine slabo presojate, vključno z agresivnim ali motečim vedenjem.
- Bipolarna depresija ali velike epizode depresije pri hudi depresivni motnji: ves čas ste zelo žalostni ali pa se počutite potrti, krive, nimate energije, apetita ali ne morete spati.

Če jemljete zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic za zdravljenje velikih depresivnih epizod pri hudi depresivni motnji, ga je treba jemati sočasno z drugimi zdravili, s katerimi zdravite to bolezen.

Vaš zdravnik vam lahko še naprej predpisuje zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic, tudi če se počutite bolje.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic

Ne jemljite zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic:

- če ste alergični (preobčutljivi) na kvetiapin ali katerokoli sestavino zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic (navedeno v poglavju 6: Dodatne informacije)
- če jemljete katero od naslednjih zdravil:
 - nekatera zdravila za zdravljenje okužbe s HIV
 - azolni antimikotiki (za zdravljenje glivičnih okužb)
 - eritromicin ali klaritromicin (za okužbe)
 - nefazodon (zdravilo proti depresiji).

Ne jemljite zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic, če kaj od zgoraj naštetega velja za vas. Če ste negotovi, se pred začetkom uporabe zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic:

Preden uporabite zdravilo, zdravniku povejte, če:

- imate ali ste imeli vi ali kdo v družini težave s srcem, na primer motnje srčnega ritma, ali pa jemljete zdravila, ki lahko vplivajo na srčni utrip.
- imate nizek krvni tlak.
- ste imeli možgansko kap, zlasti če ste starejši.
- imate težave z jetri.
- ste kadarkoli imeli napad krčev (konvulzije).
- veste, da ste v preteklosti imeli nizko raven belih krvnih celic (ki so jo lahko ali pa ne povzročila druga zdravila).
- imate sladkorno bolezen ali tveganje, da jo dobite. Če jo imate, lahko zdravnik preverjati raven sladkorja v krvi, medtem ko jemljete zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic.
- če ste imeli vi ali kdo v družini kdaj krvne strdke, ker zdravila, kot je to, povezujejo z nastajanjem krvnih strdkov.
- če ste starejša oseba z demenco (izgubo možganske funkcije). Če ste, ne jemljite zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic, saj lahko skupina zdravil, v katero sodi tudi zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic, poveča tveganje za kap ali v nekaterih primerih tveganje za smrt pri starejših osebah z demenco.

Povejte svojemu zdravniku, če se pojavi kaj od naštetega:

- kombinacija zvišane telesne temperature, hude togosti mišic, znojenja ali poslabšanja zavesti (motnja, imenovana »nevroleptični maligni sindrom«). Morda potrebujete urgentno medicinsko pomoč.
- nekontrolirani gibi, večinoma mišic obraza ali jezika.
- omotičnost ali občutek hude zaspanosti. To lahko pri starejših bolnikih poveča tveganje poškodbe zaradi nezgode (padca).
- napadi krčev (konvulzije).
- dolgotrajna ali boleča erekcija (priapizem).

Ta vrsta zdravil lahko povzroči takšna stanja.

Misli na samomor in poslabšanje depresije

Če ste depresivni, se vam občasno lahko pojavijo misli na samopoškodovanje ali samomor. Po prvi uvedbi zdravljenja z antidepresivi se lahko te misli še poslabšajo, saj ta zdravila začnejo delovati šele čez nekaj časa, običajno čez dva tedna, nekatera pa tudi kasneje. Pojav takšnih misli je verjetnejši, če ste mlajša odrasla oseba. Podatki iz kliničnih preskušanj kažejo, da obstaja pri mlajših odraslih (mlajših od 25 let) z depresijo večje tveganje za pojav samomorilnega vedenja in/ali samomorilnih misli.

Če začnete kadarkoli razmišljati o samopoškodovanju ali samomoru, se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom ali poiščite pomoč v najbližji bolnišnici. Morda bi bilo koristno, če za težave z depresijo poveste sorodniku ali dobremu prijatelju in ga prosite, da prebere to navodilo. Prosite ga lahko tudi, da naj vas opozori, če meni, da se je depresija poslabšala ali ga skrbijo spremembe v vašem vedenju.

Pri bolnikih, ki so jemali zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic, so opazili povečanje telesne mase. Vi in vaš zdravnik redno preverjajte vašo telesno maso.

Druga zdravila in zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic:

Obvestite svojega zdravnika, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. To vključuje tudi zdravila, ki ste jih kupili brez recepta in rastlinska zdravila.

Ne jemljite zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic, če jemljete katero od naštetih zdravil:

- nekatera zdravila za zdravljenje okužbe s HIV.
- azolne antimikotike (za zdravljenje glivičnih okužb).
- eritromicin ali klaritromicin (za okužbe).
- nefazodon (zdravilo proti depresiji).

Povejte svojemu zdravniku, če uporabljate katero od naslednjih zdravil:

- zdravila za zdravljenje epilepsije (kot sta fenitoin ali karbamazepin).
- zdravilo za zdravljenje nizkega krvnega tlaka.
- barbiturate (za zdravljenje nespečnosti).
- tioridazin (edeno izmed antipsihotičnih zdravil).
- zdravila, ki vplivajo na vaš srčni utrip, na primer zdravila, ki povzročijo neravnovesje elektrolitov (nizke ravni kalija ali magnezija), kot so diuretiki (zdravila za odvajanje vode) ali nekateri antibiotiki (zdravila za zdravljenje okužb).

Preden prenehate jemati katerokoli od zdravil, ki jih jemljete, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

- Hrana lahko vpliva na delovanje zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic, zato tablete zaužijte vsaj eno uro pred obrokom ali pred spanjem.
- Bodite pozorni na to, koliko alkohola popijete. Skupen učinek zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic in alkohola lahko povzroči zaspanost.
- Med zdravljenjem z zdravilom Kvetiapin Lambda Therapeutic ne pijte grenivkega soka, saj lahko vpliva na delovanje zdravila.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči, poskušate zanositi ali dojite, se pred jemanjem zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic posvetujte z zdravnikom.

Zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic ne smete jemati med nosečnostjo, razen če ste se o tem pogovorili s svojim zdravnikom. Zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic se med dojenjem ne sme uporabljati.

Naslednji simptomi se lahko pojavijo pri novorojenčkih mater, ki so uporabljale zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic v zadnjem tromesečju (zadnje tri mesece nosečnosti): tresenje, togost mišic in/ali oslabeledost, zaspanost, nemir, težave z dihanjem, in težave pri hranjenju. Če vaš otrok razvije katerega koli od teh simptomov, se boste morda morali posvetovati s svojim zdravnikom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Po jemanju tega zdravila se lahko počutite zaspani. Ne vozite in ne upravljajte z orodji ali stroji, dokler ne poznate vpliva teh tablet na vas.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic

Zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic vsebujejo laktozo, ki je vrsta sladkorja. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

Vpliv na rezultate testov drog v urinu

Uporaba zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic lahko pri testiranju drog v urinu povzroči lažno pozitivne rezultate za metadon in nekatera druga zdravila proti depresiji, imenovana triciklični antidepresivi, ko se uporablja določen način testiranja, kljub temu, da morda ne jemljete metadona ali tricikličnih antidepresivov. Če pride do tega, je treba opraviti bolj natančne teste.

3. Kako jemati zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic

Pri jemanju zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Vaš začetni odmerek bo določil zdravnik. Vzdrževalni odmerek (dnevni odmerek) je odvisen od bolezni in vaših potreb, vendar je običajno med 150 mg in 800 mg.

- Tablete boste jemali enkrat na dan.
- Tablete zaužijte cele s kozarcem vode.
- Tablet ne delite, žvečite ali drobite.
- Tablete lahko jemljete s hrano ali brez nje. (Vzemite jo vsaj eno uro pred obrokom ali pred spanjem, kot vam bo povedal zdravnik).
- Z jemanjem zdravila ne smete prenehati, tudi če se počutite dobro, razen če vam tako naroči vaš zdravnik.

- Med zdravljenjem z zdravilom Kvetiapin Lambda Therapeutic ne pijte grenivkega soka, saj lahko vpliva na način delovanja zdravila.

Težave z jetri

Če imate težave z jetri, bo morda zdravnik moral zmanjšati vaš odmerek.

Starejši ljudje

Če imate težave z jetri, bo morda zdravnik moral zmanjšati vaš odmerek.

Otroci in mladostniki stari do 18 let

Otroci in mladostniki stari do 18 let ne smejo jemati zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic, kot ga je predpisal zdravnik, se lahko pojavijo zaspanost, omotičnost in nenormalno bitje srca. Takoj podite k svojemu zdravniku ali v najbližjo bolnišnico. Zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic vzemite s seboj.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic

Če ste pozabili vzeti tableto, jo vzemite takoj, ko se spomnite. Če je že skoraj čas, da vzamete naslednji odmerek, počakajte do takrat. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali jemati zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic

Pri nenadnem prenehanju jemanja zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic se lahko pojavijo občutek slabosti ali bruhanje, nespečnost, trzajoči gibi, lahko pa se ponovno pojavi tudi vaša izvorna bolezen. Zdravnik vam bo svetoval, da pred opustitvijo zdravila odmerek zmanjšujete postopoma.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

S trenutnimi jakostjmi zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic in drugimi odobrenimi zdravili, ki vsebujejo kvetiapin, niso možni vsi režimi zdravljenja.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- omotica (lahko povzroči padce), glavobol, suha usta.
- občutek zaspanosti (med nadaljevanjem jemanja zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic bo morda izginil) (lahko povzroči padce).
- odtegnitveni simptomi (simptomi, ki se lahko pojavijo, ko prenehate jemati kvetiapin) vključujejo nespečnost (insomnijo), občutek slabosti (navzeo), glavobol, drisko, bruhanje, omotičnost ali razdražljivost. Priporočljivo je postopno prenehanje zdravljenja, ki traja najmanj en ali dva tedna.
- povečanje telesne mase.

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- hitro bitje srca,
- občutek razbijanja, hitrega bitja ali preskakovanja bitja srca (ali izpuščenih utripov srca),
- zamašen nos,
- zaprtost, težave z želodcem (slaba prebava),
- občutek šibkosti, omedlevica (lahko povzroči padce),
- otekanje rok ali nog,
- nizek krvni tlak ob vstajanju, Zaradi tega se lahko počutite omotične ali omedlite (kar lahko povzroči padce).
- zvišana raven sladkorja v krvi,

- zamegljen vid,
- nenormalni mišični gibi, vključno s težavami pri začenjanju mišičnih gibov, tresenjem, občutkom nemira ali togostjo mišic brez bolečin,
- nenavadne sanje in nočne more,
- občutek lakote
- občutek razdražljivosti,
- motnje govora ali jezika,
- misli na samomor in poslabšanje depresije,
- kratka sapa
- bruhanje (predvsem pri starejših),
- zvišana telesna temperatura.

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- napadi krčev ali konvulzije,
- alergijske reakcije, ki lahko vključujejo izbočene otekline (izpuščaje), otekanje kože in predela okoli ust,
- neprijeten občutek v nogah (imenovan tudi sindrom nemirnih nog),
- težave s požiranjem,
- nekontrolirani gibi, večinoma mišic obraza ali jezika,
- motnje na področju spolnosti,
- poslabšanje obstoječe sladkorne bolezni,
- sprememba v električni aktivnosti srca, ki se vidi na EKG (podaljšanje intervala QT).

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- kombinacija zvišane telesne temperature (vročina), znojenja, togih mišic, občutka hude zaspanosti ali omedlevice (to motnjo imenujemo »nevroleptični maligni sindrom«),
- porumenelost kože in oči (zlatenica),
- vnetje jeter (hepatitis),
- dolgotrajna in boleča erekcija (priapizem),
- otekanje prsi in nepričakovano izločanje mleka (galaktoreja),
- menstrualne motnje,
- krvni strdki v žilah, zlasti v nogah (simptomi vključujejo oteklost, bolečino in pordelost nog), ki lahko potujejo po krvnih žilah v pljuča, kjer povzročijo bolečino v prsih in težave z dihanjem. Če opazite kateregakoli od teh simptomov, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- hoja, govorjenje, uživanje hrane ali druge dejavnosti med spanjem,
- znižana telesna temperatura (hipotermija),
- vnetje trebušne slinavke.

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- hud izpuščaj, mehurji ali rdeče lise po koži,
- huda alergijska reakcija (imenovana anafilaksija), ki lahko povzroči težave v dihanju ali šok,
- hitro otekanje kože, običajno okoli oči, ustnic in grla (angioedem),
- neustrezno izločanje hormona, ki uravnava volumen urina,
- razgradnja mišičnega tkiva in bolečine v mišicah (rabdomioliza).

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- kožni izpuščaj z nepravilnimi rdečimi pikami po koži (multiformni eritem),
- huda nenadna alergijska reakcija s simptomi, kot so povišana telesna temperatura in mehurji na koži ter luščenje kože (toksična epidermalna nekroliza).
- nevtropenija
- odtegnitveni sindrom pri novorojenčkih

Razred zdravil, v katero sodi zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic, lahko povzroči težave s srčnim ritmom, ki so lahko resne, v hudih primerih pa tudi smrtno nevarne.

Nekateri neželeni učinki so vidni šele na krvnih testih. Ti vključujejo spremembe količine nekaterih maščob (trigliceridi in skupni holesterol) ali sladkorja v krvi, zmanjšanje števila nekaterih vrst krvnih celic, zmanjšanje količine natrija in povečanje količine hormona prolaktina v krvi. Povečanje hormona prolaktina lahko v redkih primerih povzroči naslednje:

- Moškim in ženskam otečejo prsi in nepričakovano začnejo izločati mleko.
- Ženske nimajo menstruacije ali jo imajo neredno.

Zato vas lahko zdravnik občasno pozove, da opravite krvne teste.

Otroci in mladostniki:

Enaki neželeni učinki, ki se lahko pojavijo pri odraslih, so lahko prisotni tudi pri otrocih in mladostnikih.

Naslednje neželene učinke so opazili samo pri otrocih in mladostnikih:

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- zvišanje krvnega pritiska.

Naslednje neželene učinke so pogosteje opazili pri otrocih in mladostnikih:

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- povečanje količina hormona, imenovanega prolaktin, v krvi, povečanje količine hormona, imenovanega prolaktina, lahko v redkih primerih povzroči:
 - Fantom in deklicam otečejo prsi in nepričakovano začnejo izločati mleko.
 - Deklicam izostane menstruacija ali jo imajo neredno.
- povečan apetit,
- nenormalni mišični gibi. Med takšnimi so težave z začenjanjem mišičnih gibov, tresenje, občutek nemira ali togost mišic, ki je ne spremljajo bolečine.

5. Shranjevanje zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic

- Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.
- Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
- Zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli ali pretisnem omotu poleg oznake "EXP". Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.
- Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Kvetiapin Lambda Therapeutic

Zdravilna učinkovina je kvetiapin (v obliki hemifumarata). Ena tableta zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic vsebuje 200 mg, 300 mg ali 400 mg kvetiapina (v obliki kvetiapinijevega hemifumarata).

Pomožne snovi so laktoza monohidrat, hipromeloza, natrijev klorid, povidon K-30, smukec, magnezijev stearat (E470b), hipromeloza 6 cP (E464), titanov dioksid (E171), makrogol 400. Tablete 200 mg in 300 mg vsebujejo tudi rumeni železov oksid (E172).

Izgled zdravila Kvetiapin Lambda Therapeutic in vsebina pakiranja

Kvetiapin tablete s podaljšanim sproščanjem 200 mg so rumene, okrogle, bikonveksne, filmsko obložene tablete z vtisnjenim napisom "I2" na eni strani in gladke na drugi strani.

Kvetiapin tablete s podaljšanim sproščanjem 300 mg so bledorumene, okrogle, bikonveksne, filmsko obložene tablete z vtisnjenim napisom "Q300" na eni strani in gladke na drugi strani.

Kvetiapin tablete s podaljšanim sproščanjem 400 mg so bele, okrogle, bikonveksne, filmsko obložene tablete z vtisnjenim napisom "I4" na eni strani in gladke na drugi strani.

Za vse jakosti so registrirane velikosti pakiranja 10, 30, 50, 60 in 100 tablet na škatlo.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Lambda Therapeutic Limited
Sage house,
319 Pinner road,
North Harrow
HA1 4HF, Middlesex
Velika Britanija

Izdelovalec:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Velika Britanija
Cemelog-BRS Ltd, H2040 Budaörs, Vasút u. 13., Madžarska
Pharmacare Premium Ltd, HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia, BBG 3000, Malta

Način/režim predpisovanja in izdaje zdravila:

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Ime države članice	Ime zdravila
AT	: Quetiapine Lambda 200 mg/300mg/400mg – Retardtabletten
BE	: Quetiapine Lambda Therapeutic 200 mg/300 mg/400 mg Comprimés à libération prolongée/Tabletten met verlengde afgifte/Retardtabletten.
BG	: Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg Prolonged release Tablets
CZ	: Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg tablety s prodĺoužným uvolňováním
DE	: Quetiapin Lambda 200mg/300mg/400mg Retardtabletten
DK	: Quetiapine Lambda
EL	: Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg παρατείνει δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης
ES	: Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg comprimidos de liberación prolongada EFG
FI	: Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg depottabletit
FR	: Quétiapine Lambda 200mg/300mg/400mg comprimé à libération prolongée
HU	: Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg retard tabletta
IE	: Noletil XL 200/300/400mg prolonged release Tablet
IT	: Quetiapina Lambda Therapeutic
NL	: Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg tabletten met verlengde afgifte
NO	: Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg Depottablett
PL	: Quetiapine Lambda
PT	: Quetiapina Lambda 200mg/300mg/400mg comprimidos de libertação prolongada
RO	: Quetiapină Lambda 200 mg/300 mg/400 mg comprimate cu eliberare prelungită
SE	: Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg depottabletter
SI	: Kvetiapin Lambda Therapeutic 200mg/300mg/400mg tablete s podaljšanim sproščanjem
SK	: Quetiapine Lambda 200mg/300mg/400mg Filmom obalené tablety s predĺženým uvolňováním
UK	: Schenix XL 200/300/400mg prolonged release Tablet

Navodilo je bilo odobreno 27.09.2012.